

J01F F01	KLINDAMYCIN Dalacin, Clindamycin (Villerton)				
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
150 mg/ml inf. konsentrat, ampulle		Må fortynnes videre ² <u>Fortynningsvæske^{2,3}:</u> NaCl 9 mg/ml eller glukose 50-100 mg/ml <u>Makskonsentrasjon^{1,3,40}</u> 18 mg/ml	<u>IV infusjon^{1,84}:</u> Over minst 10 minutter, men ikke raskere enn 20 mg/kg/time. Maks 30 mg/minutt.	<u>Ampulle¹⁵:</u> Engangsbruk <u>Fortynnet løsning^{2,3,15}:</u> 12 timer i RT 24 timer i KJ	Obs! Tromboflebitt ^{1,2} Kan gi hypotensjon og hjertestans ved for rask infusjon ^{2,4,84} Kan også gi kvalme, oppkast og diaré ²
Konsentrasjon: 150 mg/ml					
Tilleggsopplysninger^{1,2}: Kontakt lege hvis alvorlig diaré (enterokolitt) forekommer. Det finnes også klindamycin (Cleocin uregistrert) i ferdig infusjonsvæske (6 og 12 mg/ml) som gis ufortynnet. Y-settforlikelige væsker^{2,3}: NaCl 9 mg/ml, glukose 50-100 mg/ml og blandinger av disse, evt. tilsatt inntil 30 mmol KCl /liter.					
Blandekort til barn		Kilder: Se egen referanseliste.		Sist revidert: 01.11.2018	

Forslag til fortynning av klindamycin				Nyfødt
Fortynning til:	Totalvolum	Klindamycin 150 mg/ml	Fortynningsvæske	
6 mg/ml	25 ml	1 ml	24 ml	
10 mg/ml	15 ml	1 ml	14 ml	
15 mg/ml	10 ml	1 ml	9 ml	