

NB! Knuse-/delelisten må ikke brukes uavhengig av prosedyreteksten i dokumentet "Tabletter og kapsler –deling, åpning og knusing" (Dok.-ID: 10301)

## Knuse-/delelisten

### A

Abacavir/Lamivudin Tablett	9 (A, OBS)
Abbotycin ES Tablett	9 (A, OBS)
Abilify Smeltetablett	10, 15
Abilify Tablett	9
Abstral Sublingvaltablett	7
Acalka Depottablett	1
Acetazolamide Tablett	9
Acetylcystein Brusetablett	8
Acetylsalisylsyre Enterotablett	9
Actelsar HCT Tablett	9
Activelle Tablett	9 (OBS)
Actos Tablett	9
Adalat Kapsel	1
Adalat Tablett	9
Adalat CR Depottablett	1
Adalat Oros Depottablett	1
Adcirca Tablett	1
Adempas Tablett	9 (G, OBS)
Advagraf Depotkapsel	1 (OBS)
Aerius Tablett	9
Aerius Smeltetablett	1, 10, 15
Afi-D2 Forte Kapsel	2
Afinitor Tablett	1 (P)
Afipran Tablett	9
Akineton Tablett	9
Akynzeo Kapsel	1
Albyl-E Enterotablett	9
Aldactone Tablett	9 (G, OBS)
Alea Tablett	9

Alendronat Tablett	12
Alkeran Tablett	1 (C)
Allopur Tablett	9
Allopurinol Tablett	9
Aloxi Kapsel	2
Amaryl Tablett	9
Amias Tablett	9
Aminess Tablett	9
Amitriptylin Tablett	9
Amlodipin Tablett	9
Amoxicillin Oppløselig tablett	1, 9, 15 (A, OBS)
Amoxicillin Tablett	9 (A, OBS)
Amoxicillin Kapsel	9 (A, OBS)
Anafranil Tablett	9
Anagrelide Kapsel	1 (C)
Anastrozole Tablett	9, 15 (OBS)
Andriol Kapsel	2
Angusta Devats Tablett	9 (G, OBS)
Ansapipin Kapsel	15 (A, OBS)
Antabus Brusetablett	1, 8
Antepsin Tablett	4, 15
Antidotum Thalli Heyl Kapsel	3, 15
Apocillin Tablett	9 (A, OBS)
Apodorm Tablett	9
Aponova Depotkapsel	5
Apovit B-combin sterk Tablett	9
Apresolin Tablett	9
Aprovel Tablett	9
Aptivus Kapsel	2 (A, OBS)
Aquadeks Tyggetablett	14
Aquadeks Softgels Kapsel	2
Arava Tablett	9 (OBS)
Arcoxia Tablett	9
Aricept Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 1 av 15

Arimidex Tablett	9, 15 (OBS)
Aripirazole Tablett	9
Aromasin Tablett	9 (OBS)
Arthrotec Tablett med modifisert frisetting	1
Asacol Enterotablett	1
Asacol Tablett med modifisert frisetting	1
Asasantin Retard Kapsel med modifisert frisetting	5
Aspirin 500 mg Tablett	9
Aspirin 75 mg Oppløselig tablett	9, 15
Aspirin 81 mg Tyggetablett	14, 15
Atacand Tablett	9
Atacand Plus/ Atacand Plus Mite Tablett	9
Atarax Tablett	9
Atenolol Tablett	9
Atorvastatin Tablett	9, 15
Atripila Tablett	1 (A)
Attentin Tablett	9
Aubagio Tablett	9 (G, OBS)
Augmentin Tablett	9 (A, OBS)
Aurorix Tablett	9
Avelox Tablett	9 (A, OBS)
Avodart Kapsel	12 (OBS)
Azilect Tablett	9
Azitromax Tablett	9 (A, OBS)

## B

Bactrim Tablett	9 (A, OBS)
Baklofen Tablett	9
Baraclude Tablett	9 (A, OBS)
Behepan Tablett	9
Benerva Tablett	9, 15
Benetor Tablett	9
Benetor Comp Tablett	9

Berocca Brusetablett	8, 9
Betapred Tablett	14, 15 (OBS)
Betmiga Depottablett	1
Bicalutamid Tablett	9 (G, OBS)
Biltricid Tablett	9
Bioclavid Tablett	1 (A)
Bio-E-Vitamin Kapsel	2
Bisolvon Oppløselig tablett	13
Bisolvon Tablett	9
Bisoprolol Tablett	9
Bloxazoc Depottablett	4, 11
Bonefos Tablett	12
Bonviva Tablett	12
Bosentan Tablett	9 (G, OBS)
Bricanyl Tablett	9
Bricanyl Depot Depottablett	1
Brilique Tablett	9, 15
Brintellix Tablett	9
Bronkyl/ Bronkyl Forte Brusetablett	8
Brufen Retard Depottablett	1
B-Total Tablett	9
Buprenorphine Sublingvaltablett	7, 9
Burinex Tablett	9
Buscopan Tablett	9, 15
Buspiron Tablett	9

## C

Calcigran Tyggetablett	14, 15
Calcigran Forte Tyggetablett	14, 15
Calciumfolinat Tablett	9
Calcium-Sandoz/Calcium-Sandoz Forte Brusetablett	8
Campral Enterotablett	1
Candemox Comp Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 2 av 15

Candesartan Tablett	9
Candesartan HCT Tablett	9
Capecitabine Tablett	1 (C)
Captopril Tablett	9
Carbaglu Oppløselig tablett	15
Cardizem Retard Depottablett	1
Cardizem Uno Depottablett	1
Carduran CR Depottablett	1
Carvedilol Tablett	9
Casodex Tablett	9 (G, OBS)
Cataflam Tablett	9
Catapresan Tablett	9
CeeNU Kapsel	9 (C)
Celebra Kapsel	5
Celebrex Kapsel	5
CellCept Kapsel	9 (G, OBS)
CellCept Tablett	9 (G, OBS)
Celsentri Tablett	1 (A)
Centyl med kaliumklorid Tablett	1
Centyl mite med kaliumklorid Tablett	1
Certican Tablett	1 (OBS)
Certican Oppløselig tablett	15 (OBS)
Cetimax Tablett	9
Cetirizin Tablett	9
Chlorpromazine Tablett	1
Cholestagel Tablett	9
Cimetidin Tablett	9
Cimetidine Tablett	9
Cinaclet Tablett	9
Cipralax Tablett	9
Cipramil Tablett	9
Ciprofloxacin Tablett	9 (A, OBS)
Ciproxin Tablett	9 (A, OBS)
Circadin Depottablett	1

Cisordinol Tablett	9
Citalopram Tablett	9
Clarithromycin Tablett	9 (A, OBS)
Clarityn Tablett	9
Cliovelle Tablett	9 (OBS)
Clopidogrel Tablett	9
Clozapin Tablett	9
CoAprovel Tablett	9
Colazid Kapsel	15
Colrefuz Tablett	9 (OBS)
Combivir Tablett	9 (A, OBS)
Concerta Depottablett	1
Copegus Tablett	1 (A)
Cordarone Tablett	9
Corixil Tablett	9
Cortef Tablett	9 (OBS)
Cortisonacetat Tablett	9 (OBS)
Cozaar Tablett	9, 15
Cozaar Comp Tablett	9, 15
Cozaar Comp Forte Tablett	9, 15
Creon Enterokapsel	6
Cresemba Kapsel	1 (A)
Crestor Tablett	9, 15
Crixivan Kapsel	1 (A)
C-vitamin Brusetablett	8
Cycloserine Kapsel	9 (A, OBS)
Cyklokapron Tablett	9
Cymbalta Enterokapsel	6
Cytotec Tablett	9 (G, OBS)

## D

D3-vitamin Tablett	9
Daklinza Tablett	9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 3 av 15

Dalacin Kapsel	12 (A, OBS)
Danol Kapsel	1
Dantrium Kapsel	9
Dapson Tablett	9 (A, OBS)
Daraprim Tablett	9
Daxas Tablett	9
Dekristol Kapsel	2
Depakote Sprinkle Enterokapsel	15
Deprakine Enterotablett	1
Descovy Tablett	1 (A)
Detrusitol SR Depotkapsel	5
Dexamethason Tablett	9 (OBS)
Diamox Tablett	9
Diamox SR Depotkapsel	1
Diclin Kapsel	9, 15 (A, OBS)
Dicocil Kapsel	9, 15 (A, OBS)
Diclofenac Enterotablett	1
DiclofenacKalium Tablett	9
Dicloxacillin Kapsel	9, 15 (A, OBS)
Dicuno Tablett	9
Difclir Tablett	9, 15 (A, OBS)
Diflucan Kapsel	9 (A, OBS)
Digimerck Pico Tablett	9
Digoxin Tablett	9
Diovan Tablett	9
Diovan Comp Tablett	9
Disprin Oppløselig tablett	15
Diural Tablett	9, 15
Divisun Tablett	9
Dociton Retard Depotkapsel	5
Doksycyklin Tablett	12, 15 (A, OBS)
Dolcontin Depottablett	1
Donepezil Tablett	9
Dormicum Tablett	9

Dostinex Tablett	9, 15
Doxylin Tablett	12, 15 (A, OBS)
Dulcolax Enterotablett	1
Duloxetin Enterokapsel	6
Duodart Kapsel	12 (OBS)
Durbis Retard Depottablett	4
Duroferon Duretter Depottablett	1

## E

Ebastin Tablett	9
Ebixa Tablett	9
Edurant Tablett	1 (A)
Efavirenz Tablett	9 (A, OBS)
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir disoproxil Tablett	1 (A)
Efexor Depot Depotkapsel	5
Efient Tablett	9
Egazil Duretter Depottablett	1
Ekvacillin Tablett	9 (A, OBS)
Eldepryl Tablett	9, 15
Eliquis Tablett	9, 15
Elvanse Kapsel	15
Emconcor/Emconcor CHF Tablett	9
Emend Kapsel	15
Emselex Depottablett	1
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Tablett	9, 15 (A, OBS)
Emtriva Kapsel	1 (A)
Enalapril Tablett	9
Enalapril Comp Tablett	9
Enalapril HCT Tablett	9
Entecavir Tablett	9 (A, OBS)
Entocort Depotkapsel	5
Epclusa Tablett	9 (A, OBS)
Epivir Tablett	9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 4 av 15

Eplerenon Tablett	9
Equasym Depot Kapsel med modifisert frisetting	5
Eremfat Tablett	9 (A, OBS)
Ery-Max Enterokapsel	5 (A, OBS)
Esbriet Kapsel	1 (OBS)
Esbriet Tablett	1 (OBS)
Escitalopram Tablett	9
Esidrex Tablett	9
Esomeprazol Enterokapsel	5
Esopral Enterotablett	1, 11
Etalpa Kapsel	2
Etoricoxib Tablett	9
Eucreas Tablett	9
Eviplera Tablett	1 (A)
E-vitamin Kapsel	2
Evotaz Tablett	1 (A)
Exelon Kapsel	1
Exemestan Tablett	9 (OBS)
Exforge Tablett	9
Exforge HTC Tablett	9
Exjade Oppløselig tablett	13
Exjade Tablett	9
Exviera Tablett	1 (A)
Ezetrol Tablett	9

## F

Famotidin Tablett	9
Felodipin Depottablett	1
Femar Tablett	9 (OBS)
Femara Tablett	9 (OBS)
Fenantoin Tablett	9
Fenazon-Koffein/ Fenazon-Koffein sterke Tablett	9
Fenemal Tablett	9

Fenytoin NAF Tablett	9
Ferromax Tablett	1
Ferro-Retard Depottablett	1
Fevarin Tablett	12
Finasterid Tablett	9, 15 (G, OBS)
Flagyl Tablett	9 (A, OBS)
Flecaimid Tablett	9
Florinef Tablett	9 (OBS)
Fluanxol Tablett	9, 15
Fluconazol Kapsel	9 (A, OBS)
Fludara Tablett	1 (C)
Fluoxetin Kapsel	15
Fluoxetin Oppløselig tablett	11
Flutamid Tablett	9
Folsyre NAF 1 mg Tablett	9
Fontex Oppløselig tablett	11
Fortecortin Tablett	9 (OBS)
Forxiga Tablett	1
Fosamax Tablett	12
Fosrenol Tyggetablett	14
Frisium Tablett	9, 15
Fucidin Tablett	9 (A, OBS)
Furadantin Tablett	9, 15 (A, OBS)
Furix Tablett	9, 15
Furix Retard Depotkapsel	5
Furosemid Tablett	9, 15
Fycompa Tablett	9

## G

Galantamin Depotkapsel	5
Galvus Tablett	9
Gaviscon Tyggetablett	14
Genvoya Tablett	1 (A)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 5 av 15



Gilenya Kapsel	9 (G, OBS)
Glaupax Tablett	9
Gleostine Kapsel	9 (C)
Glibenclamid Tablett	4
Glimepirid Tablett	9
Glivec Tablett	4, 15 (G, P)
Glucophage Tablett	9
Glucosamin Tablett	9
Granisetron Tablett	9, 15
Granpidam Tablett	9
Grazax Smeltetablett	7

## H

Haldol Tablett	9
Haloperidol Tablett	9
Harvoni Tablett	9 (A, OBS)
Heminevrin Kapsel	1
Hepsera Tablett	9, 15 (A, OBS)
Hiprex Tablett	9 (A, OBS)
Hycamtin Kapsel	1 (C)
Hydrea Kapsel	15 (C)
Hydrochlorothiazide Tablett	9
Hydrocortisone Tablett	9 (OBS)
Hydrokon Tablett	9
Hydroxyurea Kapsel	15 (C)
Hydroxyzine Tablett	9

## I

Ibandronsyre Tablett	12
Ibumax Tablett	9, 15
Ibumetin Tablett	9, 15
Ibux Kapsel	2
Ibux Tablett	9, 15

Iclusig Tablett	1 (P)
Idebenone Kapsel	15
Imacillin Tablett	9, 15 (A, OBS)
Imatinib Kapsel	15 (G, P)
Imatinib Tablett	4, 15 (G, P)
Imbruvica Kapsel	1 (P)
Imdur Depottablett	4
Imigran Tablett	9
Imigran Radis Tablett	9, 15
Imnovid Kapsel	1 (OBS)
Imodium Tablett	9, 15
Imogas Kapsel	2
Imovane Tablett	9
Imurel Tablett	9 (G, OBS)
Inderal Tablett	9
Indomet Kapsel	15
Inegy Tablett	9
Inexium Enterotablett	1, 11
Infloran Kapsel	15
Inovelon Tablett	9
Inspra Tablett	9
Intelence Tablett	15 (A, OBS)
Invirase Tablett	9 (A, OBS)
Irbesartan Tablett	9
Irbesartan HCT Tablett	9
Iressa Tablett	11 (G, P)
Isentress Tyggetablett	14 (A, OBS)
Isentress Tablett	1 (A)
Ismo Tablett	1
Ismo Retard Depottablett	1
Isoniazid NAF Tablett	9 (A, OBS)
Isoptin Tablett	9
Isoptin Mite Tablett	9
Isoptin Retard Depottablett	4

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 6 av 15

Isosorbidmononitrat Tablett	9
Isotretinoin Kapsler	2 (OBS)
Ixoten Tablett	1 (C)

Kredex Tablett	9
Kreon Enterokapsel	6
Kuvan Oppløselig tablett	9, 13

## J

Jakavi Tablett	9 (G, P)
Janumet Tablett	9, 15
Januvia Tablett	9, 15
Jardiance Tablett	9

## K

Kalcipos-Vitamin D Tablett	9, 15
Kaleorid Depottablett	1
Kaletra Tablett	1 (A)
Kaliumjodid Tablett	9, 15
Kaliumklorid Depottablett	1
Kalsium Tyggetablett	14, 15
Kalsium m/vit D3 Tyggetablett	14, 15
Kandesartan Tablett	9
Kandesartan HCT Tablett	9
Keflex Tablett	9 (A, OBS)
Kepra Tablett	9
Kestine Tablett	9
Kettesse Tablett	9
Ketoconazole Tablett	9 (A, OBS)
Ketorax Tablett	9
Ketovite Tablett	9
Kivexa Tablett	9 (A, OBS)
Klacid OD Depottablett	1 (A)
Klomipramin Tablett	9
Kodein Tablett	9
Kohle-Compreten Tablett	15
Kolkisin Tablett	9 (OBS)

## L

Lamictal Oppløselig tablett/Tyggetablett	14, 15
Lamisil Tablett	9 (A, OBS)
Lanoxin Tablett	9
Lansoprazol Enterokapsel	5
Lanvis Tablett	9 (C)
Lanzo Melt Smeltetablett	1, 10, 11
Largactil Tablett	1
Lariam Tablett	9, 15
Lasix Retard Depotkapsel	5
Latuda Tablett	9
Leflunomide Tablett	9 (OBS)
Leponex Tablett	9
Lerkanidipin Tablett	9
Lescol Kapsel	1
Lescol Depot Depottablett	1
Letrozol Tablett	9 (OBS)
Leukeran Tablett	1 (C)
Levaxin Tablett	9, 15
Levomepromazine Tablett	9
Linezolid Tablett	9, 15 (A, OBS)
Lioresal Tablett	9
Liothyronin Tablett	9
Lipitor Tablett	9, 15
Lisinopril Tablett	9
Lisinopril HTC Tablett	9
Liskantin Tablett	9
Lithionit Depottablett	4
Litiumkarbonat Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 7 av 15

Lixiana Tablett	9
Lodoz Tablett	9
Lomir Tablett	9
Lomir SRO Depotkapsel	1
Lomustine Kapsel	9 (C)
Loniten Tablett	9
Loperamid Kapsel	9
Lopid Kapsel	15
Loratadin Tablett	9
Losartan Tablett	9, 15
Losartan HTC Tablett	9, 15
Losec Mups Enterotablett	11
Lovastatin Tablett	9, 15
Lymecyclin Kapsel	12 (A, OBS)
Lynparza Kapsel	1 (C)
Lyrice Kapsel	15
Lysodren Tablett	9 (C)

Medikinet Kapsel med modifisert frisetting	5
Medrol Tablett	9, 15 (OBS)
Melatonin Kapsel	9
Melatonin PR Depottablett	1
Melatonina Tablett	9
Meloxicam Tablett	9
Memantin Tablett	9
Mestinin Tablett	9
Metadon Tablett	9, 15
Metamina Tablett	9
Metformin Tablett	9
Methotrexate Tablett	4, 15 (C)
Methylidopa Tablett	9
Methylphenidate Depottablett	1
Methylprednisolone Tablett	9, 15 (OBS)
Metoclopramide Tablett	9
Metoprolol Tablett	9
Metoprolol Sandoz Depottablett	4, 11
Metronidazol Tablett	9 (A, OBS)
Mexiletine Kapsel	9
Mezavant Enterodepottablett	1
Micardis Tablett	9, 15
MicardisPlus Tablett	9
Mifepristone Tablett	9 (G)
Miktosan Kapsel med modifisert frisetting	1
Mimpara Tablett	9
Mindiab Tablett	9, 15
Minifom Kapsel	2
Minirin Smeltetablett	7
Mirtazapin Smeltetablett	1, 10, 15
Mirtazapin Tablett	9
Mobic Tablett	9
Moclobemid Tablett	9
Modifenac Kapsel med modifisert frisetting	5

## M

Madopar Kapsel	15
Madopar Depot Depotkapsel	1
Madopar Solubile Oppløselig tablett	15
Magnesium Tyggetablett	14
Magnesium 350 mg Tablett	9
Malarone Tablett	9
Malarone Junior Tablett	9
Malfin Depottablett	1
Marevan Tablett	9
Marevan u/farge Tablett	9
Marzine Tablett	9
Maxalt Tablett	1
Maxalt RapiTab Smeltetablett	10, 15
Medikinet Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 8 av 15



Modiodal Tablett	9
Moduretic Mite Tablett	9
Mogadon Tablett	9
Monoket OD Depotkapsel	5
Montelukast Tablett	9
Montelukast Tyggetablett	14
Morfin Tablett	9
Motilium Tablett	9
Moventig Tablett	9
Moxonidin Tablett	9
Mucomyst Brusetablett	8
Multaq Tablett	9
Myambutol Tablett	9 (A, OBS)
Myfenax Kapsel	9 (G, OBS)
Myfenax Tablett	9 (G, OBS)
Myfortic Enterotablett	9 (G, OBS)
Mykofenolat Kapsel	9 (G, OBS)
Mykofenolsyre Enterotablett	9 (G, OBS)
Myleran Tablett	1 (C)

## N

Naltrexone Tablett	9
Napren-E Enterotablett	1
Naproxen Tablett	9
Naproxen-E Enterotablett	1
Naramig Tablett	9
Natriumklorid Tablett	9
Natron NAF Tablett	9
Natulan Kapsel	1
Navelbine Kapsel	1 (C)
Navoban Kapsel	9
Naxogin Tablett	9 (OBS)
Nemdatine Tablett	9

Neofordex Tablett	9 (OBS)
Neo-Mercazole Tablett	9
Neotigason Kapsel	9 (OBS)
Neurontin Tablett	9
Neurontin Kapsel	15
Nexavar Tablett	1 (P)
Nexium Enterotablett	1, 11
Niaspan Depottablett	1
Nifedipin AL Kapsel	1
Nifenova Depottablett	1
Niferex Enterokapsel	5
Nimoral Tablett	9 (OBS)
Nimotop Tablett	1
Nitroglycerin Sublingvaltablett	7
Nobligan Kapsel	15
Nobligan Retard Depottablett	1
Nocdurna Smeltetablett	7
Nolvadex Tablett	9, 15 (G, OBS)
Noritren Tablett	9
Normix Tablett	3, 9 (A, OBS)
Normorix Mite Tablett	9
Norprolac Tablett	9
Norvasc Tablett	9
Norvir Tablett	1 (A)
Noskapin Tablett	9
Novaluzid Tyggetablett	14
Noxafil Enterotablett	1 (A)
Nozinan Tablett	9, 15
Nuelin Depot Depottablett	4
Nycoplus B-Total Tablett	9
Nycoplus C-vitamin Brusetablett	8
Nycoplus C-vitamin Tablett	9
Nycoplus D3-vitamin Tablett	9
Nycoplus E-vitamin Kapsel	2

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 9 av 15

Nycoplus Ferro-Retard Depottablett	1
Nycoplus Folsyre 0,4 mg Tablett	9
Nycoplus Magnesium Tyggetablett	14
Nycoplus Magnesium 350 mg Tablett	9
Nycoplus Multivitaminer Tablett	9
Nycoplus Selen med E-vitamin Tablett	9

## O

Odefsey Tablett	1 (A)
Ofev Kapsel	1 (P)
Olanzapin Smeltetablett	1, 10, 15
Olanzapin Tablett	9
Olmetec Tablett	9
Olmetec Comp Tablett	9
Olysio Kapsel	1 (A)
Omacor Kapsel	2
Omeprazol Enterokapsel	6
Omnicep Depottablett	1
Ondansetron Smeltetablett	9, 10, 15
Ondansetron Tablett	9
Onglyza Tablett	1
Oprymea Tablett	9
Opsumit Tablett	1
Optinate Septimum Tablett	12
Orfiril Enterotablett	1
Orfiril Long Depotkapsel	5
Orfiril Retard Depottablett	1
Orisild Tablett	9
Orodek Tablett	9
Orudis Depotkapsel	5
Ospolot Tablett	9
Otezla Tablett	1 (OBS)
Ovesterin Tablett	9 (OBS)

Oxycodone Kapsel	15
OxyContin Depottablett	1
Oxydorine Depottablett	1
OxyNorm Kapsel	9

## P

Padviram Tablett	1 (A)
Palexia Tablett	9
Palexia Depot Depottablett	1
Palladon Depotkapsel	5
Pamol Tablett	9
Pamol Smeltetablett	10, 15
Panodil Tablett	9
Panodil Zapp Tablett	9
Pantoprazol Enterotablett	1
Paracet Brusetablett	8
Paracet Smeltetablett	10, 15
Paracet Tablett	9
Paracetamol Tablett	9
Paralgin Forte Tablett	9
Paramax Tablett	9
Paramax Comp Tablett	9
Paricalcitol Kapsel	2
Parlodel Tablett	9
Paroxetin Tablett	9
Penomax Tablett	9 (A, OBS)
Pentasa Depottablett	4, 11
Pepcid Tablett	9
Perigona Tablett	9
Perphenazin Tablett	9
Persantin Tablett	9
Persantin Retard Kapsel med modifisert frisetting	5
Peteha Tablett	9, 15 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 10 av 15

Phenergan Tablett	9, 15
Phenhydan Tablett	9
Phenytoin AWD Tablett	9
Phosphate-sandoz Brusetablett	8
Physiotens Tablett	9
Pinex Brusetablett	8
Pinex Tablett	9
Pinex Smeltetablett	10, 15
Pinex Forte Brusetablett	8
Pinex Forte Tablett	9
Pioglitazone Tablett	9
Plaquenil Tablett	9
Plavix Tablett	9
Plenadren Tablett med modifisert frisetting	1
Plendil Depottablett	1
Polaramin Tablett	9
Postafen Tablett	9
Pradaxa Kapsel	1
Pramipexol Tablett	9
Pranolol Tablett	9
Pravachol Tablett	9
Pravastatin Tablett	9
Precosa Kapsel	15 (OBS)
Prednisolon Tablett	9 (OBS)
Prednisolone Oppløselig tablett	1, 8 (OBS)
Prezista Tablett	9 (A, OBS)
Primaquine Phosphat Tablett	9
Probecid Tablett	9
Prograf Kapsel	3 (OBS)
Progynova Tablett	9 (OBS)
Propal Retard Depotkapsel	5
Propranolol Tablett	9
Proscar Tablett	9, 15 (G, OBS)
Provaqomyl Tablett	9

Provera Tablett	9 (OBS)
Proxan Tablett	9
Puri-Nethol Tablett	4 (C)
Pursennid Tablett	9
Pyrazinamid Tablett	9 (A, OBS)
Pyridoksin NAF Tablett	9

## Q

Quetiapin Depottablett	1
Quetiapin Tablett	9

## R

Ramipril Tablett	9
Ranitidin Tablett	9
Rapamune Tablett	1 (OBS)
Rasagilin Tablett	9
Rasilez Tablett	9
Rebetol Kapsel	1 (A)
Relifex Oppløselig tablett	8
Relifex Tablett	9
Relpax Tablett	9
Reltebon Depottablett	1
Remeron Tablett	9
Remeron-S Smeltetablett	1, 10, 15
Reminyl Depotkapsel	5
Renagel Tablett	1
Renavit Tablett	9
Renitec Tablett	9
Renitec Comp/ Renitec Comp Mite Tablett	9
Renvela Tablett	1
Requip Tablett	9, 15
Requip Depot Depottablett	1
Resochin Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Revatio Tablett	9
Revlimid Kapsel	1 (OBS)
Revolade Tablett	1
Reyataz Kapsel	6 (A, OBS)
Rezolsta Tablett	1 (A)
Riamet Tablett	9
Rifater Tablett	1 (A)
Rifinah Tablett	9 (A, OBS)
Rilutek Tablett	9
Riluzol Tablett	9
Rimactan Kapsel	9 (A, OBS)
Rimactazid Tablett	9 (A, OBS)
Rimcure Tablett	1 (A)
Rimstar Tablett	1 (A)
Rinexin Depottablett	1
Risperdal Tablett	9, 15
Risperidon Tablett	9, 15
Ritalin Kapsel med modifisert frisetting	5
Ritalin Tablett	9
Ritonavir Tablett	1 (A)
Rivastigmin Kapsel	1
Rivotril Tablett	9
Rocaltrol Kapsel	2
Ropinirol Depottablett	1
Ropinirol Tablett	9, 15
Rosuvastatin Tablett	9, 15

## S

Sabrillex Tablett	9 (OBS)
Salazopyrin EN Enterotablett	1
Samin Tablett	9
Samsca Tablett	9, 15
Sandimmun Neoral Kapsel	1 (OBS)

Sarotex Tablett	9
Sarotex Retard Depotkapsel	5
Sebivo Tablett	9, 15 (A, OBS)
Selen med E-vitamin Tablett	9
Selexid Tablett	9 (A, OBS)
Selo-Zok Depottablett	4, 11
Sendoxan Tablett	1 (C)
Serdolect Tablett	9
Seroquel Tablett	9
Seroquel Depot Depottablett	1
Seroxat Tablett	9
Sertralin Tablett	9, 15
Sevelamer Tablett	1
Sevikar Tablett	9
Sifrol Tablett	9
Sifrol Depottablett	1
Simvastatin Tablett	9, 15
Sinalfa Tablett	9
Sinemet Tablett	9, 15
Sinemet Depot Mite Depottablett	1
Sinequan Kapsel	15
Singulair Tablett	9
Singulair Tyggetablett	14
Sirturo Tablett	9 (A, OBS)
Sivextro Tablett	9 (A, OBS)
Skilarence Enterotablett	1 (OBS)
Sobril Tablett	9, 15
Solian Tablett	9
Solupred Brusetablett	8, 9 (OBS)
Solvezink Brusetablett	8, 9
Somac Enterotablett	1
Sotacor Tablett	9, 15
Sotalol Tablett	9, 15
Sovaldi Tablett	9 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A):** Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C):** Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G):** Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P):** Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 12 av 15

Spiricort Tablett	9 (OBS)
Spirix Tablett	9 (G, OBS)
Spironolactone Tablett	9 (G, OBS)
Sporanox Kapsel	1 (A)
Sprycel Tablett	1 (P)
Stalevo Tablett	3, 9
Stayveer Tablett	9 (G, OBS)
Stemetil Tablett	9
Stesolid Tablett	9
Stilnoct Tablett	9
Stilnox Tablett	9
Stocrin Tablett	9 (A, OBS)
Strattera Kapsel	1
Stribild Tablett	1 (A)
Suboxone Sublingvaltablett	7, 9
Subutex Sublingvaltablett	7, 9
Sulfadiazine Tablett	9 (A, OBS)
Sumatriptan Tablett	9
Surmontil Tablett	9

**T**

Tacni Kapsel	3 (OBS)
Tadalafil Tablett	9
Tafinlar Kapsel	1 (P)
Tagrisso Tablett	15 (G, P)
Tambocor Tablett	9
Tambocor Retard Depotkapsel	5
Tamiflu Kapsel	9 (A, OBS)
Tamoxifen Tablett	9, 15 (G, OBS)
Tamsulosin Depottablett	1
Tamsulosin Kapsel med modifisert frisetting	1
Tarceva Tablett	15 (G, P)
Targiniq Depottablett	1

Targretin Kapsel	2 (C)
Tarivid Tablett	9 (A, OBS)
Tasigna Kapsel	6 (G, P)
Tavanic Tablett	9 (A, OBS)
Tavegyl Tablett	9
Tegretol Tablett	9, 15
Tegretol Retard Depottablett	4, 11
Telfast Tablett	9
Telmisartan Tablett	9, 15
Temesta Tablett	9, 15
Temgesic Sublingvaltablett	7, 9
Temodal Kapsel	6 (C)
Temomedac Kapsel	6 (C)
Temozolomid Kapsel	6 (C)
Tenofovir disoproxsil Tablett	9, 15 (A, OBS)
Tenormin Tablett	9
Terbinafin Tablett	9 (A, OBS)
Tetracyclin Kapsel	15 (A, OBS)
Tetracyclin Tablett	15 (A, OBS)
Tetralysal Kapsel	12 (A, OBS)
Teveten Tablett	9
Teveten Comp Tablett	1
Thalidomide Kapsel	9 (G, OBS)
Theo-Dur Depottablett	4
Tiamin Tablett	9, 15
Titralac Tablett	10, 14
Tivicay Tablett	9 (A, OBS)
Toilax Enterotablett	1
Tolvon Tablett	9
Topimax Kapsel	5
Topimax Tablett	9
Topiramate Tablett	9
Toviaz Depottablett	1
Tracafour Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Tracleer Tablett	9 (G, OBS)
Trajenta Tablett	9, 15
Tramadol Kapsel	15
Tramagetic OD Depottablett	1
Tramagetic Retard Depottablett	1
Trampalgin Tablett	4
Trandate Tablett	9
Trental Depottablett	1
Triatec Tablett	9
Trientine Kapsel	9
Trilafon Tablett	9
Trileptal Tablett	9, 15
Trimetoprim Tablett	9 (A, OBS)
Trimonil Retard Depottablett	4, 11
TrioBe Tablett	9
Triumeq Tablett	9 (A, OBS)
Trizivir Tablett	1 (A)
Truvada Tablett	9, 15 (A, OBS)
Truxal Tablett	9
Tyverb Tablett	1 (P)

## U

Uptravi Tablett	9, 15
Urocit-k Depottablett	1
Uromitexan Tablett	9
Ursochol Kapsel	9
Ursodeoksykolsyre Kapsel	9
Ursofalk Kapsel	9
Ursofalk Tablett	9

## V

Valaciclovir Tablett	9 (A, OBS)
Valcyte Tablett	1 (A, OBS)

Valganciclovir Tablett	1 (A, OBS)
Valium Tablett	9
Vallergan Tablett	9
Valsartan Tablett	9
Valsartan HCT Tablett	9
Valtrex Tablett	9 (A, OBS)
Vancomycin Kapsel	1 (A)
Vanquin Tablett	3
Velphoro Tyggetablett	14
Vemlidy Tablett	9 (A, OBS)
Venclyxto Tablett	9 (C)
Venlafaxin Depotkapsel	5
Venlix Tablett	9
Venorion Depotkapsel	5
Vepesid Kapsel	2 (C)
Vesanoid Kapsel	2 (C)
Vesicare Tablett	9 (OBS)
Vfend Tablett	9 (A, OBS)
Viagra Tablett	9, 15
Viekirax Tablett	1 (A)
Vimovo Tablett med modifisert frisetting	1
Vimpat Tablett	9, 15
Viramune Depottablett	1 (A)
Viramune Tablett	9 (A, OBS)
Viread Tablett	9, 15 (A, OBS)
Vival Tablett	9
Vivotif Enterokapsel	1
Volibris Tablett	9 (G, OBS)
Voltaren Enterotablett	1
Voltarol Kapsel	2
Voriconazole Tablett	9 (A, OBS)
Vosevi Tablett	9 (A, OBS)
Votrient Tablett	1 (P)
Votubia Oppløselig tablett	15 (G, P)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 14 av 15



Votubia Tablett	15 (G, P)
-----------------	-----------

## W

Weifa C-vitamin Brusetablett	8
Weifa Kalsium Tyggetablett	14, 15
Weifa Kalsium m/D-vit Tyggetablett	14, 15
Weifapenin Tablett	9 (A, OBS)
Wellbutrin Retard Tablett med modifisert frisetting	1
Wilzin Kapsel	15

## X

Xagrid Kapsel	1 (C)
Xalkori Kapsel	1 (P)
Xanor Tablett	9
Xanor Depot Depottablett	1
Xarelto Tablett	9, 15
Xatral Depottablett	1
Xeljanz Tablett	9 (OBS)
Xeloda Tablett	1 (C)
Xenical Kapsel	9
Xifaxan Tablett	3, 9 (A, OBS)
Xyzal Tablett	9

## Z

Zanidip Tablett	9
Zantac Brusetablett	8
Zantac Tablett	9
Zavesca Kapsel	15
Zebinix Tablett	9
Zeffix Tablett	9 (A, OBS)
Zeldox Kapsel	1
Zemplar Kapsel	2
Zentel Tablett	9, 15

Zentel Tyggetablett	14
Zepatier Tablett	1 (A)
Zestoretic Tablett	9
Zestoretic Mite Tablett	9
Zestril Tablett	9
Ziagen Tablett	9 (A, OBS)
Ziprasidon Kapsel	1
Zocor Tablett	9, 15
Zofran Smeltetablett	9, 10, 15
Zofran Tablett	9
Zolmitriptan Smeltetablett	10
Zolmitriptan Tablett	1
Zolofit Tablett	9, 15
Zolpidem Tablett	9
Zomig Tablett	9
Zomig Rapimelt Smeltetablett	10
Zonegran Kapsel	15 (OBS)
Zopiklon Tablett	9
Zopitin Tablett	9
Zovirax Tablett	9 (A, OBS)
Zyban Depottablett	1
Zykadia Kapsel	15 (G, P)
Zyloric Tablett	9
Zyprexa Tablett	9
Zyprexa Velotab Smeltetablett	1, 10, 15
Zyrtec Tablett	9
Zyvoxid Tablett	9, 15 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 9: Om nødvendig kan kapselen åpnes/tabletten knuses eller deles.
- 10: Smeltes på tungen, og svelges.
- 11: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle legemidler. Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301). Skal ikke håndteres av gravide.
- (G): Gravide skal ikke knuse/dele eller løse opp tabletter/kapsler, men kan håndtere intakte/ hele tabletter/kapsler forutsatt bruk av hansker.
- (OBS): Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.
- (P): Proteinkinasehemmere. Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 8	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Hilde Myhren
	Dato: 28.11.2019	Side 15 av 15