

MRSA retningslinjer - Pasient *

I de siste 12 måneder

- har fått påvist MRSA
- har familiemedlem med MRSA
- innlagt eller jobbet i helseinstitusjon
 - med MRSA-utbrudd
 - i utlandet**
- fått omfattende poliklinisk behandling eller tannbehandling i utlandet**
- bodd eller arbeidet i:
 - flyktningleir, katastrofeområde i utlandet**
 - asylmottak, også i Norge/Norden
- oppholdt seg som pårørende >2 timer på sykehus i utlandet**

For mer enn 12 måneder siden:

- Fått påvist MRSA uten 3 senere negative prøvesett

- fått piercing eller tatovering i utlandet**

Sammenhengende opphold i utlandet** i minst 6 uker

Eksponert for medpasient eller personale med MRSA i OUS

Ta kontakt med Avd. for smittevern for separat vurdering

Prøvetaking (se prosedyre):

Alle pasienter:

- nese
- hals
- perineum

Hvis aktuelt også:

- sår/eksem/øregang
- navle hos nyfødte
- kateter instikksted
- dren
- kateterurin

Prøvetaking (se prosedyre):

Alle pasienter:

- nese
- hals
- perineum

Hvis aktuelt også:

- sår/eksem/øregang
- navle hos nyfødte
- kateter instikksted
- dren
- kateterurin

Økt risiko for smittespredning:

- store sår/eksem/brannskade
- klinisk infeksjon i hud/luftveier
- tracheostomi

Nei

Ja

Kontaktsmitteisolering med munnbind

Positiv prøve: Videre isolering

Negativ prøve: Opphev isolering

Økt risiko for smittespredning:

- store sår/eksem/brannskade
- klinisk infeksjon i hud/luftveier
- tracheostomi

Ja

Nei

Luftmitteisolering med munnbind

Positiv prøve: Videre isolering

Negativ prøve: Opphev isolering

Ikke isolering

Positiv prøve: Kontaktsmitteisolering med munnbind

VED POSITIV PRØVE: kontakt Avd. for smittevern

Aker/Radiumhospitalet: 971 37 839

Ullevål: 480 16 240

Rikshospitalet: 902 38 406

*Foreldre/pårørende testes også hvis de har vært utsatt for samme risiko og skal oppholde seg i sykehuset.

**Utlandet = utenom Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island).