

Makrobeskjæring - Placenta




Fig. 1: Fersk, ikke fiksert placenta, hjerteformet uten diagnostisk betydning.



Fig. 2 (a og b): Formalinfiksert placenta, belt formet formvariant med patologisk betydning. (1)
Membran.




Fig. 3: Illustrasjon. a: Placenta med biplacenta. Navlesnoren er festet på hoved placenta. b: Placenta bilobata, ikke komplett delt i to. c: Placenta bipartita, komplett delt i to, med velamentøs festet navlesnor.




Fig. 4: Formalinfiksert placenta med bi-placenta. a: føtal overflate, b: maternell flate.



Fig. 5: Formalinfiksert placenta bilobata.



Fig. 6: Formalinfiksert placenta bipartita.



Fig. 7: Formalinfiksert placenta ekstrachorialis partialis.




Fig. 8: Illustrasjon til venstre og formalinfiksert placenta til høyre. Placenta circumvallata med (a) inne rand/margin (margo internus), og (b) ytre rand/margin (margo externus). Randbrem må være ca. 5 mm høy, avstand mellom inne og ytre rand >2cm.




Fig. 9: Ikke fiksert tvillingplacenta av monochorial-monamniotal type. Velamentøs festete navlesnor. Tusjinjeksjon i begge navlesnorenes arterie o venen.




Fig. 10: Ikke fiksert placenta. Furcuat (gaffelaktig) festet navlesnor.




Fig. 5.11: Illustrasjon. Normal og invasive placentatyper.