

PASIENTINFORMASJON OM MIDAZOLAM

- et legemiddel for akuttbehandling av langvarige epileptiske anfall

Preparater

- Buccolam munnvann (oppløsning) 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg per sprøyte (ferdigfylte oralsprøyter).
- Epistatus "Special Products Ltd" bukkal løsning 10 mg/ml (flaske med tilhørende engangssprøyter (passer ikke sammen med sprøytespisser)).

Om midazolam

Midazolam munnvann/oppløsning er beregnet til bukkal bruk (innsiden av kinnet) eller eventuelt til bruk i nesen. Midazolam tilhører gruppen benzodiazepiner. Midazolam munnvann er et alternativ til Stesolid Prefill rektalvæske og brukes for å stoppe langvarige epileptiske anfall, serieanfall eller status epileptikus.

Dosering

- Vanlig dosering for voksne er 10 mg (én full sprøyte), noen trenger høyere dose (15 mg).
- Dosering for barn er 0,3 mg/kg eller den styrken legen har bestemt i forhold til tilgjengelige styrker av Buccolam. Maksimal dose er 10 mg.
- Ved manglende effekt kan dosen gjentas etter 10 minutter (eventuelt kan andre dose være høyere enn den første, men aldri lavere).

Behandlingsskjema

Legen vil vanligvis lage et behandlingsskjema for den enkelte pasient med en skriftlig anbefaling for når akuttbehandling skal settes i verk, med hvilket legemiddel og i hvilke doser. Oppbevar behandlingsskjemaet sammen med legemiddelet slik at informasjonen er tilgjengelig.

Effekt

Effekten kommer vanligvis i løpet av 4-5 minutter. Anfallet opphører gradvis. Ved manglende effekt kan dosen gjentas etter 10 minutter. Dersom anfallet ikke har gitt seg 5 minutter etter den andre dosen, må lege/AMK (113) kontaktes (se pasientens behandlingsskjema). Det er vanlig å bli trett og sove noen minutter eller opp til 2-3 timer etter inntak.

Slik bruker du medisinen

- Buccolam leveres i ferdigfylt sprøyte. Dosen gis i munnhulen på innsiden av kinnet, halv dose på hver side, i små porsjoner slik at væsken ikke svelges. Dersom væsken svelges, blir effekten svakere og kommer senere. Det kan være praktisk å føre sprøyten vannrett inn mellom kinn og tenner. Sprøyten føres opp, og midazolam sprøytes deretter nedover, inn mellom kinnet og tannrekken.
- Epistatus trekkes opp fra flasken med engangssprøyte. Bruk de sprøytene som leveres med flasken og er kun beregnet til bruk i munnen og må ikke injiseres (sprøytespisser passer ikke på oralsprøytene).
- Epistatus ferdig opptrukket i sprøyte er holdbar i to måneder i romtemperatur. Sprøyten må påsettes en plasthette som passer til sprøyten (kan leveres av firmaet Vitaflo, tlf.

67112540) og merkes godt. Dersom noe væske fordamper, kan midazolam skilles ut. Innholdet i sprøyten (eller flasken) kan da bli blakket (hvite partikler kan observeres). I så fall må innholdet ikke brukes. Av samme grunn må derfor korken umiddelbart skrus godt på igjen når væske er trukket opp fra flasken.

- Buccolam munnvann i ferdig opptrukket sprøyte er holdbar til utløpsdatoen på pakningen. Sprøytene skal oppbevares i det beskyttende plastrøret til den skal brukes.
- Midazolam skal ikke fryses eller oppbevares i kjøleskap.
- Gjør ingen endring i dosering eller behandlingsopplegget

Forsiktighetsregler

- Akuttbehandling med midazolam bør begrenses, men kan brukes flere ganger i uken om nødvendig. Hyppig bruk kan gå utover pasientens funksjonsevne (se Bivirkninger).
- Bør ikke brukes hos de med avhengighet til legemidler/rusmidler

Bivirkninger

Uttalt tretthet er vanlig. Hos barn og eldre kan man av og til se forvirring og uro. Nedsatt pusteevne kan forekomme, særlig hvis man velger å dele opp dosen i flere mindre doser (noe som ikke anbefales). Overdosering kan behandles med flumazenil (Anexate). Midazolam har kort halveringstid. Dette innebærer at stoffet går fort ut av kroppen (i løpet av to-tre timer). Bivirkningene er dermed kortvarige.

Kombinasjon med andre medisiner

Midazolam kan forsterke virkningen/bivirkninger av enkelte andre legemidler (smertestillende, beroligende og sovemidler) og av alkohol.

Blodprøver

Måling av konsentrasjonen i blodet er ikke aktuelt.

Graviditet og amming

Langvarige, generaliserte tonisk-kloniske anfall kan skade det ufødte barnet. Akuttbehandling er derfor nødvendig også under svangerskap. Midazolam går over i morsmelk, og kan påvirke barnet. Det anbefales å avbryte ammingen i 24 timer etter bruk av midazolam. Det er viktig at spørsmålet om amming tas opp med legen.

Medisiner på utenlandsreise

Hovedregelen er at du må kunne dokumentere at du er den rettmessige eier, og at medisinen bør oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. Dokumentasjon som godtas, er legeerklæring, kopi av resept eller originalemballasje fra apotek i Norge.

For **midazolam** gjelder i tillegg:

- For reiser innen Schengen-området må du ha med deg en Schengen-attest. Denne får du på forespørsel utstedt på apoteket. Attesten er gyldig for én måneds forbruk. Hvis du vet at du skal være borte mer enn én måned, kan du be apoteket føre på kun utreisedato.
- For reiser til alle andre land kan du ha med deg midazolam til én måneds forbruk.
- Evt. kan det søkes Legemiddelverket om tillatelse til å ha med midazolam for lengre tid.

Andre opplysninger

Når behandling med midazolam bukkal løsning forskrives, skal pasienten utstyres med et behandlingsskjema påført personidentifikasjon, medikamentmengde i mg (og evt. ml) og hvor lenge et anfall eller serieanfall kan vare før behandling skal startes. Buccolam munnvann er registrert i Norge til personer under 18 år. Buccolam kan skrives på blå resept; refusjonskode G40/N88