Oslo universitetssykehus

Forlikelighetstabell, vedlegg til **Forlikelighet av intravenøse legemidler i sentrale og perifere innganger**, Dok-ID: 26943

	pH	Acetylcystein	Adrenalin	Amiodaron	Deksmedetomidin	Dobutamin	Dopamin	Esketamin	Esomeprazol	Fentanyl	Fenylefrin	Furosemid	Glukose 50 mg/ml	Glukose 100 mg/ml	Glukose 200 mg/ml	Glukosel	Glyseroltrinitrat	Heparin	Insulin	Kaliumdihydrogenfosfat	Kaliumklorid	Ketamin	Klonazepam	Klonidin	Labetalol	Levosimendan	Lidokain	Magnesiumsulfat	Metoprolol	Midazolam	Morfin	NaCl 9 mg/ml	Nimodipin	Nitroprussid	Noradrenalin	Oksykodon	Pantoprazol	Paracetamol	Propofol	Remifentanil	Tiopental	Valproat	Vasopressin
Acetylcystein	7,0																																										
Adrenalin	3,0 – 3,8																																										
Amiodaron	3,5 – 4,5																																										
Deksmedetomidin	4,5 – 7,0																																										
Dobutamin	2,5 – 5,5																																										
Dopamin	2,5 – 4,0																																										
Esketamin	3,0 – 5,0																																										
Esomeprazol	8,5 – 11,0																																										
Fentanyl	5,0 – 7,5																																										
Fenylefrin	4,5 – 6,5																																										
Furosemid	8,9 – 9,3																																										
Glukose 50 mg/ml	4,0 – 5,0																																										
Glukose 100 mg/ml	4,0 – 5,0																																										
Glukose 200 mg/ml	4,0 – 5,0																																										
Glukosel	3,5																																										
Glyseroltrinitrat	3,0 – 7,0																																										
Heparin	5,0 – 8,0																																										
Insulin	7,0 – 7,8																																										
Kaliumdihydrogenfosfat	6,2 – 7,8																																										
Kaliumklorid	4,5 – 7,5																																										
Ketamin	3,5 – 5,5																																										
Klonazepam	3,8 – 4,5																																										
Klonidin	4,0 – 7,0																																										
Labetalol	3,5 – 4,5																																										
Levosimendan	3,5 – 4,0																																										
Lidokain	4,0 – 7,0																																										
Magnesiumsulfat	4,5 – 7,0																																										
Metoprolol	5,0 – 8,0																																										
Midazolam	2,9 – 3,7																																										
Morfin	3,0 – 5,0																																										
Natriumklorid 9 mg/ml	4,5 – 7,0																																										
Nimodipin	6,8																																										
Nitroprussid	3,5 – 6,0																																										
Noradrenalin	3,0 – 4,5																																										
Oksykodon	4,8 – 5,2																																										
Pantoprazol	9,0 – 11,5																																										
Paracetamol	4,5 – 5,5																																										
Propofol	6,0 – 8,5																																										
Remifentanil	2,5 – 3,5																																										
Tiopental	10,2 – 11,2																																										
Valproat	7,0 – 9,0																																										
Vasopressin	2,4 – 4,5																																										

Slik bruker du tabellen:

= Legemidlene er forlikelige

= Legemidlene er **IKKE** forlikelige

= Mangler data. Ikke anta forlikelighet. Kontakt farmasøyt eller lege

Følgende forutsetninger gjelder ved bruk av forlikelighetstabellen:

- Legemidlene er forlikelige i alle konsentrasjoner
- Forlikelighet er kun sjekket mellom kombinasjoner av to legemidler i NaCl 9 mg/ml og/eller Glukose 50 mg/ml
- Ved spørsmål om forlikelighet i andre infusjonsvæsker, inkludert ernæring, må produsentens egne data sjekkes eller farmasøyt kontaktes

Husk!

1. Jevnlig kontroll av slanger/løp
2. Å sjekke hvorvidt infusjonsvæskene er forlikelige med begge legemidlene
3. Gis det bolus av et legemiddel vil dette også gi en høyere hastighet av andre legemidler i samme løp/lumen