

Før blandekortet tas i bruk, må retningslinjen [Blandekort – Utblending og administrering av parenterale legemidler til voksne](#) (dok-ID: 132842) gjennomgås.

C02A C01	Sengeenhet				
	<b>KLONIDIN</b> Catapresan (Boehringer Ingelheim, Glenwood GmbH, uregistrerte) Skal bare brukes sammen med prosedyre dok-ID: 142065				
Styrke	Stam-løsning	Videre fortynning	Administrering	Holdbarhet RT=Romtemperatur K= Kjøleskap	Merknader
150 mikrogram/ml  inj.væske  ampulle		Må fortynnes før bruk <sup>1,2</sup> ,  <b>Fortynningsvæske:</b> <sup>1,2,3</sup> NaCl 9 mg/ml  <b>IV infusjon:</b> <sup>2,3,4,5</sup> Dosen fortynnes med 100 ml fortynningsvæske	Bør gis i SVK eller stor perifer vene <sup>2</sup>  <b>IV infusjon:</b> Over 30 minutter <sup>4</sup>	Holdbarhet er inkludert brukstid!  <b>Ampuller:</b> <sup>1,6</sup> Engangsbruk  <b>Fortynnet løsning:</b> <sup>1, 6</sup> 24 timer i RT/K	Ekstravasasjon kan gi vevsskade <sup>2</sup>  Risiko for hypertensiv krise ved brå seponering <sup>1, 2</sup>  Kan gi blodtrykksøkning ved rask injeksjon <sup>1,2</sup>  Kan gi hypotensjon og bradykardi ved høye doser <sup>1</sup>  Mål puls og blodtrykk før og etter infusjon <sup>4</sup>  Ved systolisk blodtrykk <80 og/eller puls <45 OG pasienten er klinisk påvirket; se prosedyre (Dok-ID: 142065) <sup>4</sup>

## Referanser

1. SPC tilsendt fra produsent: Catapresan, Glenwood, 11.2020
2. [NHS Injectable Medicines Guide](#)
3. [American Society of Health-System Pharmacists's Handbook on Injectable drugs](#)
4. Retningslinje om klonidin intravenøst på sengepost, akuttklinikken nivå 2 (Dok-ID: 142065)
5. The College London Hospitals University Pharmacy Department: Injectable medicines administration guide, 3<sup>rd</sup> ed. Wiley-Blackwell 2010
6. eHåndboksdokument: Holdbarhet etter anbrudd (brukstid) av sterile legemidler (Dok-ID 7996)