

Atleplase (Actilyse) - Tilbereding

- **Dose/ Konsentrasjon**
 - 2mg/2ml (til pasienter over 30 kg). Under 30 kg: 110% av lumenvolum)
 - Volum til PICC-line, se [Fyllingsvolum\(priming\) Picc-line Power Picc Solo](#)
- **Tilbereding**
 - Trekk opp tilsetningsvæsken (sterilt vann) med en sprøyte
 - Overfør det til hetteglasset med Actilysepulver
 - Ikke rist, roter forsiktig til alt pulveret er løst opp
 - Dersom luftbobler, la oppløsningen stå noen minutter til de forsvinner
 - Oppløsningen består nå av Actilyse 1mg/ml
 - Visuell kontroll: Den skal være klar og fargeløs til svak gul og fri for partikler
 - Ta ut 2 ml av løsningen
 - Bruk en sprøytespiss med 5 micro filter
- **Instillasjonsvolum**
 - 2 ml til pasienter over 30 kg.
 - Dersom to lumen, 2 ml i hvert lumen
 - Volum til PICC-line, se [Fyllingsvolum\(prming\) Picc-line Power Picc Solo](#)
- **Virketid**
 - 30 -120 minutter (kan stå opp til 24 t)
 - Kan etterlates i kateteret over natten om nødvendig
 - Aspirer 4-5 ml og kast (dersom ikke mulig , skyll det inn)
 - Kan gjenta doseringen
- **Holdbarhet**
 - Den ferdig tilberedte oppløsningen er vist å være stabil i :
 - 24 timer ved 2- 8 °C
 - og i 8 timer opp til 25 °C.

Kilde: Felleskatalogen, eHåndboken OUS

