

Trastuzumab (Herceptin®) - pasientinformasjon

Trastuzumab (Herceptin®) gis til pasienter med ulike krefttyper. Trastuzumab er et antistoff. Den kan gis alene eller i kombinasjon med cellegift. Trastuzumab gis hver 3. uke, eller oftere. Antall kurer vurderes individuelt

Hvordan kan jeg forberede meg?

Det er ingen spesielle forberedelser

Hvordan foregår behandlingen?

Før hver kur treffer du lege eller sykepleier. Trastuzumab gis som oftest som en sprøyte som settes under huden (subcutant) i låret i løpet av fem minutter. Kuren kan også gis via en kanyle i en blodåre på armen. Antistoffet er like effektivt når det gis under huden som når det gis intravenøst. Ved første behandling observeres du for bivirkninger i 2 timer fra start av behandlingen.

Etter at kuren er avsluttet kan du reise hjem.

Bivirkninger det kan være nyttig å kjenne til i forbindelse med denne kuren

Behandlingen med Trastuzumab er forbundet med få bivirkninger.

Overfølsomhetsreaksjoner

Trastuzumab kan gi overfølsomhetsreaksjoner. Symptomer på dette kan være feber, frysninger og plutselige smerter. Reaksjonene på trastuzumab kommer vanligvis under første behandling. En sykepleier vil derfor observere deg tett under den første kuren.

Forholdsregler:

- Gi beskjed om eventuell kjent allergi slik at lege/sykepleier er oppmerksomme på økt risiko for overfølsomhetsreaksjoner.
- Ta kontakt med legen din eller sykehuset der du har fått behandling hvis tegn til overfølsomhetsreaksjoner inntreffer etter at du kommer hjem.

Bivirkningene kan helt eller delvis lindres med hjelp av legemidler.

Påvirkning av hjertet

Herceptin kan påvirke hjertefunksjonen og man kan utvikle hjertesvikt. Derfor kontrolleres hjertefunksjonen jevnlig..