

Utarbeidet av: Ole Solheim, Pål Rønning, Morten Lund-Johansen, Jon Ramm-Pettersen, Eirik Helseth, Mads Aarhus og Roar Kloster

Oppfølging av insidentale, asymptomatiske meningeom

Minst 1 av faktorene

- Ingen av faktorene over

Minst 2 av faktorene

- Alder ≥ 75
- Tumorstørrelse < 2 cm
- Svart (lavt) T2-signal eller forkalket på CT
- Alvorlig, livsbegrensende komorbiditet

[illegible]

Postoperativ oppfølging av WHO grad 1 og 2 meningeom[#]

<i>Tid siden kirurgi</i>	<72 timer	6 mnd	1 år	3 år	5 år	6 år	10 år	15 år
WHO grad 1, konveksitet*, komplett radiologisk reseksjon	X		X			X		
WHO grad 1, alle andre lokasjoner og/eller resttumor	X		X	X		X	X	X
WHO grad 2, alle reseksjonsgrader	X	X	X	X		X	X	X

Ved nye nevrologiske symptomer tas ekstra MR utenom algoritme

* Ekskl. parasagittale

Oppfølging av meningeom primærbehandlet med strålebehandling[#]

<i>Tid etter primær SRS</i>	6 mnd	1 år	3 år	5 år	6 år	10 år	15 år
Etter primær SRS	X	X	X		X	X	X

Ved nye nevrologiske symptomer tas ekstra MR utenom algoritme

Ved radiologisk vekst under oppfølging:

- Vurdere behandlingstiltak eller hyppigere kontroller

Oppfølging av symptomatiske meningeom:

- Individualiseres

Oppfølging etter residivbehandling/vekst:

- Individualiseres