

Utblanding av (lavdose) Actilyse 0,25 mg/ml

OBS ! Dette er IKKE standard kateterlås til barn, men gis bare etter spesiell forordning fra lege som kateterlås i hemodialysekateter til barn under 10 kg.

HUSK !

- Blandes rett før bruk, gjerne ved frakobling hemodialyse
- **Dobbeltsjekk og aseptisk teknikk:**

1. Blande ut Actilyse til styrke 1mg/ml

(Denne styrken brukes til voksne dialysepasienter med dårlig funksjon i dialysekateter.)

- Bruk esken med «Actilyse 10 mg» med følgende hetteglass inni:
 - Actilyse 10 mg (tørrstoff)
 - Sterilt vann 10 ml til fortynningsvæske
- Ta på sterile hansker
- Desinfiser begge hetteglass med en steril kompress fuktet med Klorhexidin 5 mg/ml
- La det tørke
- Trekk opp 10 ml sterilt vann i 10 ml sprøyte med en opptrekksspiss
- Ta av opptrekksspissen
- Sett på en ny opptrekksspiss og installér det sterile vannet i hetteglasset med tørrstoffet
- Rotér forsiktig** hetteglasset med Actilyse til alt pulveret har løst seg opp. Oppløsningen skal være klar og fargeløs til svakt gul og være fri for partikler.

Tilsetning		
Dato/kl:	13/9-22	Sign/Sign: TDF/KAS
Tilsatt legemiddel:	Actilyse tørrstoff	10mg
	Sterilt vann (fortynningsvæske)	10ml
	→ Actilyse 1mg/ml	
Pas.id:		Adm.måte:

Rett før avkobling på sterilt dekkestykke:

2. Blande en (lavdose) Actilyse 0,25 mg/ml:

- Vær to sykepleiere som kan dobbeltsjekke hverandre
- Ta på sterile hansker
- Desinfiser hetteglasset med utblandet Actilyse 1mg/ml med en steril kompress fuktet med Klorhexidin 5 mg/ml
- Trekk opp 3 ml NaCl 9 mg/ml i en 5 ml sprøyte
- Trekk opp 1 ml av blandingen Actilyse 1mg/ml med en 1 ml sprøyte med opptrekksspiss og installér inn i 5 ml sprøyten
- Til sammen blir dette 4 ml, som gir styrken 0,25 mg/ml Actilyse.

BRUKES TIL DIALYSE

Tilsatt: Dato: 13/9-22
ACTILYSE 0,25mg/ml
 A: 0,8 ml V: 0,9 ml

Tilsetning		
Dato/kl:	13/9-22	Sign/Sign: TDF/KAS
Tilsatt legemiddel:	Actilyse utblandet 1mg/ml	1ml
	NaCl 9mg/ml	3ml
	→ Actilyse 0,25mg/ml	
Pas.id:		Adm.måte:

Dette trenger du:

- En ny **uåpnet Actilyse** som inneholder;
 - 10 mg tørrstoff og 10 ml sterilt vann (fortynningsvæske) (Ikke ta en ferdigblandet).
- Sterile kompresser fuktet med Klorhexidin 5 mg/ml
- En 10 ml sprøyte
- tre opptreks spisser
- En 5 ml sprøyte
- En 1 ml sprøyte
- NaCl 9 mg/ml fuktet med Klorhexidin 5 mg/ml og satt inn perforator
- To tilsetningslapper

Referanse:

ID 2516 «SVK, Hickmann og veneport; håndtering av komplikasjoner ved innleggelse og bruk av»
Under Tiltak: «Ved verifisert trombe kan lege forordne **lavdose Actilyse** etter følgende oppskrift:.....»

Skriv inn vedleggets tittel	Org.enhet: Dialysen, Avd. transplantasjonsmedisin	Nivå: 2	Versjon:
Utarbeidet av: Karin Stevanovic og Tina Duboutcq Frøystad med farmasøyt Kari Christiane Fougner Bjerknes	Godkjent av: Kristian Heldal	Godkjent dato: 13.09.2022	Side 2 av 2
Dato for utskrift: 13.09.2022. Dato oppdateres automatisk. Slett denne røden om dato for utskrift ikke er ønskelig			