

## Barrierspray

### Generell bruksanvisning:

1. Behandlingen bør starte **før** første strålebehandling, og gjentas hver 48. time.
2. Ved inkontinens/ diare som krever hyppig rengjøring, kan påføring hver 24. time vurderes, men ikke oftere.
3. Skal påføres etter rengjøring av strålefelt.
4. Hold munnstykket 10-15 cm fra huden, og påfør et jevnt lag over det aktuelle området.
5. Dersom barrierefilmen skal påføres områder med hudfolder eller annen hud-mot-hud kontakt, må områdene holdes fra hverandre i 30 sekunder inntil filmen har tørket helt før de kan slippes tilbake i original posisjon.
6. Sprayen er alkoholfri og svir ikke. Kan benyttes på slimhinner, sår og skadet hud, og forstyrrer ikke sårtilheling.
7. Bruk av annen krem/lotion i området som er sprayet med barrierspray er ikke hensiktsmessig, da det vil ha begrenset effekt.
8. Avslutt behandlingen ved ubehag. Det kan da bli aktuelt med andre tiltak etter samråd med sykepleier eller lege.

### Produktbeskrivelse:

- Produktet oppbevares i romtemperatur.
- For holdbarhet, se utløpsdato på flasken.
- Barrierspray er fargeløs, gjennomsiktig og har «pustende» egenskaper.
- Barrierspray betraktes som brannfarlig til den har tørket helt på huden og dampen har løst seg opp. Ikke bruk barrierspray i nærheten av ild, flammer, varme, gnister eller tennkilder.
- Brukes i et godt ventilert rom.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå kontakt med øynene.

Barrierspray bruksanvisning	Org.enhet: AKB	Nivå: 2	Version: 3
Utarbeidet av: Silje Hermanrud/ Ola Markali	Godkjent av: Jørgen Smeby	Dato: 19.03 - 24	Side 1 av 1