

Legemidler og kosttilskudd ved metabolske sykdommer hos barn

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
AMINOSYRER PULVER <i>Complete Amino Acid Mix (Nutricia)</i> <i>V.nr: 899549</i>	200 g	Nyfødt intensiv UL Spesialkjøkkenet for barneernæring RH	Pulveret kan blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde, men pulveret kan tette sonden.	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet etter åpning: 1 måned i romtemperatur Holdbarhet etter utblanding: Maks 24 timer i kjøleskap	Bestilles fra sykehusapoteket
AMINOSYRER, ESSENSIELLE PULVER <i>Essensiell Amino Acid Mix (Nutricia)</i> <i>V.nr: 868532</i>	200 g	Nyfødt intensiv RH	Pulveret kan blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde, men pulveret kan tette sonden.	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet etter åpning: 1 måned i romtemperatur Holdbarhet etter utblanding: Maks 24 timer i kjøleskap	Bestilles fra sykehusapoteket

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
BETAINE PULVER Cystadane <i>V.nr: 108697</i>	180 g	Finnes ikke på basislager ved OUS.	Flasken ristes forsiktig før åpning. En strøken måleskje gir følgende betaindoser: ▪ Grønn måleskje = 100 mg ▪ Blå måleskje = 150 mg ▪ Rosa måleskje = 1000 mg Kan blandes i væske (vann, juice, melk), næringstilskudd eller mat. Pulveret skal være helt oppløst. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet etter åpning: 3 måneder i romtemperatur Oppløst pulver gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket
BIOTIN INJEKSJON <i>Biotin SA injeksjon</i> <i>V.nr: 206423</i>	1 mg/ml, 10 ml	Nyfødt intensiv UL	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte Injeksjonsvæsken kan om nødvendig gis peroralt.	Oppbevares i kjøleskap Hetteglass: Engangsbruk	Bestilles produsert fra sykehusapoteket Leveringstid: ca. 4 uker

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
BIOTIN KAPSLER <i>Biotin SA kapsler</i> V.nr: 206424	10 mg, 100 stk. Andre styrker kan avtales med sykehusapoteket	Nyfødt intensiv RH	Kapslene kan åpnes og innholdet kan overføres til en sprøyte og blandes med vann. Kapslene kan være vanskelige å åpne. Etter at innholdet i kapselen er tømt over i en sprøyte bør man skylle kapslene for pulvere rester. Innholdet vil ikke løses opp fullstendig. <u>Sonde:</u> Kan gis på sonde, men vær oppmerksom på at pulveret kan tette sonden. NB! Skal ikke blandes i melk eller administreres i tåteflaske.	Oppbevares i romtemperatur Oppløst kapselinnhold gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles produsert fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-3 virkedager
CARBAMYLGLUTAMAT TABLETTER <i>Ucedane (kargluminsyre) dispergerbare tabletter</i> V.nr: 194133	200 mg, 12 stk.	Nyfødt intensiv RH Barnepost 1 RH	Løses hele i minst 5-10 ml sterilt vann. Skal ikke knuses. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Oppløste tabletter gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: Carbaglu dispergerbare tabletter, 200 mg, 5 stk, v.nr 024112. NB: kjøleware (holdbar 1 måned i romtemperatur etter åpning) Bestilles fra sykehusapoteket

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
COENZYM Q10 KAPSLER <i>Bio-Qinon Q10 Gold kapsler</i> V.nr: 922815	100 mg, 60 stk.	Finnes ikke på basislager ved OUS.	Kapselen kan stikkes hull i og innholdet presses ut direkte i munnen eller på en skje. Innholdet i kapselen kan eventuelt blandes i fettholdig væske som tran og MCT-olje. <u>Sonde:</u> Anbefales ikke. Preparatet kan feste seg til sonden. Velg mikstur.	Oppbevares i romtemperatur Oppløst kapselinnhold gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: Bio-Qinon Q10 kaps. 30 mg, 150 stk. (v.nr. 800417) Leveringstid: 1-2 uker
COENZYM Q10 MIKSTUR <i>Liquid CO-Q10 Mikstur (uregistrert)</i> V.nr: 221360	10 mg/ml, 240 ml	Nyfødt intensiv RH	Miksturen er bruksklar. Kan om nødvendig blandes i mat eller væske. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur beskyttet mot lys i originalemballasjen. Holdbarhet etter åpning: I kjøleskap til utløpsdato	Bestilles fra sykehusapoteket OBS! Styrkeangivelse på flaske: 50 mg/5 ml
HYDROKSOKOBALAMIN INJEKSJON (VITAMIN B12) <i>Vitamin B12 Depot injeksjon Orifarm</i> V.nr: 135843	1 mg/ml, 5 x 1 ml	Nyfødt intensiv RH Nyfødt intensiv UL Akuttgeriatrisk UL Indremedisin UL	Gis intramuskulært Bruk ufortynnet løsning	Oppbevares i romtemperatur Ampuller: Engangsbruk	Bestilles fra sykehusapoteket

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
HYDROKSOKOBALAMIN (VITAMIN B12) INJEKSJONSVÆSKE OG MIKSTUR <i>Hydroxocobalamine Acetat Sterop (uregistrert)</i> <i>V.nr: 267997</i>	5 mg/ml, 3 x 2 ml	Finnes ikke på basislager ved OUS.	<u>Peroral administrering av injeksjonsvæske:</u> 1 ampulle fortynnes i 100 ml sterilt vann. Deldose trekkes ut fra blandingen. <u>Intramuskulær administrering av injeksjonsvæske:</u> Injeksjonsvæsken gis ufortynnet <u>Sonde:</u> Mikstur og injeksjonsvæske kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Ampuller: Engangsbruk Holdbarhet fortynnet løsning: 5 dager i kjøleskap	Bestilles fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-4 uker OBS! Styrkeangivelse: 10 mg/2 ml Alternativ: Neocytamen injeksjonsvæske og mikstur, 1mg/2,5ml ampulle (uregistrert). Leveringstid: 2-4 uker
IDEBENONE TABLETTER <i>Amizal Idebeneone tabletter (uregistrert)</i> <i>V.nr: 681427</i>	45 mg, 60 stk.	Nyfødt intensiv RH	Tablettene kan om nødvendig knuses og blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Knuste/delte/oppløste tabletter brukes umiddelbart	Bestilles fra sykehusapoteket Leveringstid: 3-4 uker

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
KALSIUMFOLINAT (FOLINSYRE) INJEKSJON <i>Kalsiumfolinat injeksjon</i> <i>V.nr: 007718</i>	10 mg/ml, 10 x 10 ml	Barnekreft BKBS1 RH Blodsykdommer RH Onkologisk Pol.kl. / post 2.etg. UL Antidot Medisinsk Intensiv UL Infusjonsenheden og Infusjonsenhet 2 RAD A8 og B8 RAD	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte		Bestilles fra sykehusapoteket
KALSIUMFOLINAT (FOLINSYRE) MIKSTUR <i>Kalsiumfolinat SA mikstur</i> <i>V.nr: 681355</i>	5 mg/ml, 40 ml	Finnes ikke på basislager ved OUS.	Miksturen er bruksklar. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i kjøleskap Holdbarhet mikstur: 1 måned fra produksjonsdato	Bestilles produsert fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-3 virkedager
KALSIUMFOLINAT (FOLINSYRE) TABLETTER <i>Calciumfolinate tabletter</i> <i>V.nr: 462161 (10 enpac)</i> <i>V.nr: 328407 (20 endos)</i>	15 mg, 10 enpac/ 20 endos	Barnekreft BKBS1 RH Blodsykdommer RH A3, A8, B3 og B8 RAD Antidot Medisinsk Intensiv UL Infeksjonsmedisin UL	Kan om nødvendig knuses og blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Knuste/delte/oppløste tabletter brukes umiddelbart	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: Lederfolat tabl. 5 mg, 50/100 stk. Leveringstid: 2-4 uker
KALSIUMLEVOMEFOLATE TABLETTER <i>Prefolic enterotabletter (uregistrert)</i> <i>V.nr: 305221</i>	15 mg, 30 stk.	Finnes ikke på basislager ved OUS.	Må svelges hele	Oppbevares i romtemperatur	Bestilles fra sykehusapoteket

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
L-ARGININ INJEKSJON <i>Arginin HCL NAF injeksjon</i> <i>V.nr: 335935</i>	1 mmol/ml, 10 x 100 ml	Nyfødt intensiv RH Nyfødt intensiv UL Barnemed. dagpost UL Generell intensiv 1 RH Generell intensiv UL Medisinsk dagpost UL Intensiv RAD	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte		Bestilles fra sykehusapoteket
L-ARGININ PULVER <i>L-Arginine pulver Nutricia</i> <i>V.nr: 980829</i>	100 g	Nyfødt intensiv RH	Kan blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller sondemat/myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet etter åpning: 1 måned i romtemperatur Oppløst pulver gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: L-arginine 500 mg kaps., 120 stk. Leveringstid: 2-4 uker
L-CITRULLINE KAPSLER <i>L-Citrulline Source Natural kapsler (uregistrert)</i>	500 mg, 120 stk.	Finnes ikke på basislager ved OUS.	Kan om nødvendig åpnes og pulveret kan blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde, men vær oppmerksom på at pulveret kan tette sonden.	Oppbevares i romtemperatur Oppløst kapselinnhold gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-4 uker Alternativ: L-citrulline SA 500 mg kaps., 100 stk. (V.nr: 287602). Kan også lage 250 mg. Leveringstid: ca. 1 uke

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
L-CITRULLINE PULVER <i>L-CITRULLINE pulver Nutricia</i> <i>V.nr: 943699</i>	100 g	Nyfødt intensiv RH	Kan blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet etter åpning: 1 måned i romtemperatur Oppløst pulver gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: L-Citrulline Powder 200 g (Doctor's Best) Leveringstid: 2-4 uker
LEVOCARNITIN INJEKSJON <i>Carnicor injeksjon</i> <i>(uregistrert)</i> <i>V.nr: 330882</i>	200 mg/ml, 10 x 5 ml	Barneintensiv RH Barnepost 1 RH BTXS1 Barnepost 2 RH BTXS2 Barnekreft BKBS1 RH Nyfødt intensiv RH Nyfødt intensiv UL Antidot Medisinsk Intensiv UL	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte		Bestilles fra sykehusapoteket OBS! Styrkeangivelse på esken: 1 g/5 ml Alternativ: Carnitene Specific inj. 200 mg/ml (uregistrert; V.nr 298252) Bestilles fra sykehusapoteket
LEVOCARNITIN MIKSTUR <i>Biocarn sirup</i> <i>(uregistrert)</i> <i>V.nr: 277244</i>	303 mg/ml, 50 ml	Barnepost 1 RH BTXS1 Barnepost 2 RH BTXS2	Miksturen er bruksklar. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet etter åpning: 3 måneder i romtemperatur	Bestilles fra sykehusapoteket

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
NATRIUMBENZOAT INJEKSJON <i>Natriumbenzoat SA injeksjon*</i> <i>V.nr: 255308</i> <i>*erstatte Amzoate 200 mg/ml</i>	200 mg/ml, 10 x 10 ml	Nyfødt intensiv RH Nyfødt intensiv UL	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte		Bestilles produsert fra sykehusapoteket Leveringstid: ca. 4 uker
NATRIUMBENZOATE PULVER <i>Natriumbenzoate pulver</i> <i>V.nr: 256542</i>	40 g	Nyfødt intensiv RH	Pulveret må veies og løses opp i væske: Dette kan ta noen minutter. Bruk minst 1 ml væske per 300 mg pulver. Pulveret kan løses i melk eller vann uten kullsyre, alternativt blandes i myk mat som yoghurt eller syltetøy <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Oppløst pulver gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket
NATRIUMBENZOATE OG NATRIUMFENYLACETAT INJEKSJON <i>Ammonul injeksjon*</i> <i>(uregistrert)</i> <i>V.nr: 345422</i> <i>*erstatte:</i> <i>Amzoate 200 mg/ml og</i> <i>Ambutyrate 200 mg/ml</i>	Per 1 ml: 100 mg natrium- benzoat + 100 mg natrium- fenylacetat 50 ml	Nyfødt intensiv RH	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte	Bestilles fra sykehusapoteket Leveringstid: ca. 1 uke	

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
NATRIUMFENYLBUTYRAT PULVER <i>Ammonaps granulat pulver</i> <i>V.nr: 585393</i>	940 mg/g, 266 g	Nyfødt intensiv RH	En strøken måleskje gir følgende doser: ▪ Hvit måleskje = 1,2 g ▪ Gul måleskje = 3,3 g ▪ Blå måleskje = 9,7 g Blandes med væske (f.eks. vann, eplejuice) eller myk mat (f.eks. eplemos). <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde. Bland med vann og rør til granulatet løses opp (gir en melkehvit væske).	Oppbevares i romtemperatur Oppløst pulver gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket
NATRIUMFENYLBUTYRAT TABLETTER <i>Ammonaps tabletter (uregistrert)</i> <i>V.nr: 312554</i>	500 mg, 250 stk.	Finnes ikke på basislager ved OUS	Tablettene svelges hele med rikelig mengde væske. <u>Ved svelgevansker/sonde:</u> Velg Ammonaps granulat	Oppbevares i romtemperatur	Bestilles fra sykehusapoteket
PYRIDOKSALFOSFAT (KOENZYM PLP) KAPSLER <i>Pyridoksal-5-phosphate Douglas kapsler (uregistrert)</i> <i>V.nr: 271324</i>	50 mg, 100 stk.	Nyfødt intensiv RH	Kapselen kan åpnes og innholdet røres ut i vann, men vil ikke løses opp fullstendig. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde, men vær oppmerksom på at pulveret kan tette sonden.	Oppbevares i romtemperatur Oppløst kapselinnhold gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Ved deldoser må pulveret deles i riktig dose før blanding i væske

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
PYRIDOKSIN (VITAMIN B6) INJEKSJON <i>Pyridoxin NAF injeksjonsvæske</i> <i>V.nr: 335950</i>	50 mg/ml, 20 ml	Nyfødt intensiv RH Nyfødt intensiv UL Barnemed. sengepost UL (BULS1) Antidot Medisinsk intensiv UL	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte.		Bestilles fra sykehusapoteket
PYRIDOKSIN (VITAMIN B6) TABLETTER <i>Pyridoxin NAF tabletter</i> <i>V.nr: 350858</i>	40 mg, 100 stk.	Nyfødt intensiv RH Barneinfeksjon UL (BULS3) Barnemed. sengepost UL (BULS1) A8 og B8 RAD Blodsykdommer RH	Tabletten kan om nødvendig deles, knuses og/eller løses i vann. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Knuste/delte/oppløste tabletter gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket
PYRIDOKSIN SA MIKSTUR <i>Pyridoxinhydroklorid SA mikstur</i> <i>V.nr: 206695</i>	10 mg/ml, 100 ml	Barnepost 1 RH (BTXS1)	Miksturen er bruksklar og kan administreres vha. peroral eller enteral sprøyte.	Oppbevares i romtemperatur Holdbarhet mikstur: 3 måneder fra produksjonsdato	Bestilles produsert fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-3 virkedager Alternativ: Vitamin B-6 Liquid mikstur 40mg/ml, 120 ml (uregistrert, v.nr. 265304) Bestilles fra sykehusapoteket

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) INJEKSJON <i>Vitamin B2 Streuli injeksjon (uregistrert)</i> <i>V.nr: 349511</i>	5 mg/ml, 10 x 2 ml	Nyfødt intensiv UL Nyfødt intensiv RH	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte		Bestilles fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-4 uker
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) MIKSTUR <i>Riboflavin SA mikstur</i> <i>V.nr: 712306</i>	10 mg/ml, 100 ml	Finnes ikke på basislager ved OUS	Miksturen er ferdig blandet og kan administreres vha. peroral eller enteral sprøyte. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i kjøleskap Holdbarhet mikstur: 1 måned fra produksjonsdato	Bestilles produsert fra sykehusapoteket Leveringstid: 2-3 virkedager
RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) TABLETTER <i>Riboflavin Windmill tabletter (uregistrert)</i> <i>V.nr: 248085</i>	50 mg, 100 stk.	Nyfødt intensiv RH	Tabletten kan om nødvendig deles, knuses og/eller røres ut i vann, men vil ikke løses opp fullstendig. <u>Sonde:</u> Anbefales ikke. Pulveret løser seg dårlig i vann og kan tette sonden. Velg mikstur.	Oppbevares i romtemperatur Knuste/delte/oppløste tabletter gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: 1. Vitamin B2 100 mg veg. kaps. (Solgar) 2. Cyto-B2 pulver 100 g (Solace) Leveringstid: 3-4 uker for begge

VIRKESTOFF LEGEMIDDELFORM <i>Preparat</i>	STYRKE, ENHET	HVOR FINNES PREPARATET? (Sjekk TønSys)	TILBEREDNING OG ADMINISTRERING	OPPBEVARING OG HOLDBARHET	MERKNADER
TIAMIN INJEKSJON (VITAMIN B1) INJEKSJON <i>Thiamine Sterop injeksjon</i> <i>V.nr: 173949</i>	50 mg/ml, 10 x 2 ml	Nyfødt intensiv RH Nyfødt intensiv UL	Se blandekort (nasjonalt/lokalt) til barn/nyfødte		Bestilles fra sykehusapoteket
TIAMIN (VITAMIN B1) TABLETTER <i>Tiamin NAF tabletter</i> <i>V.nr: 235929</i>	3 mg, 100 stk. Finnes også som endose	Øre/nese/hals sengepost RH	Tabletten kan om nødvendig deles, knuses og/eller løses i vann. <u>Sonde:</u> Kan gis i sonde	Oppbevares i romtemperatur Knuste/delte/oppløste tabletter gis umiddelbart etter tilberedning	Bestilles fra sykehusapoteket Alternativ: Tiamin NAF 150 mg tbl., Benerva 300 mg tbl. Bestilles fra sykehusapoteket