

Intubasjon av barn - hjelpeark

	Nyfødt / < 1 år	Barnehage (1-5 år)	Skole/ungdom (6-18 år)
Sug (flere av hver)	Grønn/Blå/Svart	Blå/Svart/Hvitt	Svart/hvitt
Laerdalbag	Nyfødt/barn (< 5kg)	Barn (5 -30 kg)	Barn/voksen (>30 kg)
Luskobag (husk kne)	500 ml bag	500 ml bag	1000 ml bag
Maske	Laerdal 00+0/1+2 (3 forskjellige runde)	Laerdal 2+VBM 2 og 3	VBM 3+4
Svelgtube	00 + 0 +1	1+1,5 + 2	2 + 3
Medisiner	<i>Sprøyttestørrelse</i>		
Propofol 1-4mg/kg 10mg/ml	2 + 5 ml	5 ml + 5 ml	10 ml + 10 ml
evt. Ketamin 1-2 mg/kg 10mg/ml	2 ml	5 ml	10 ml
Fentanyl 1-2 µg/kg 50µg/ml	1 ml	2 ml	5 ml
Rokuronium (Esmeron®) 1mg/kg 10 mg/ml	1 ml	5 ml	5 ml
evt. Suxametonum 1 mg/kg			
> 30 kg: 50 mg/ml			2 ml
< 30 kg: 10 mg/ml (<i>fortynnet</i>)	1 ml	2 ml	5 ml
evt. Adrenalin 10 µg/ml <i>fortynnet katastrofeadrenalin</i>	1 + 10 (9) ml	10ml	10ml
Laryngoskop			
Mac (krumt)	0 + 1	1 + 2	2 + 3
Miller (rett)	00 + 0		
Tuber (mikrocuff)	3.0+3.5+4.0	4.0+4.5+5.0 (+5.5)	5.5 -->
Magills tang	Minste mulige	Mellomstørrelse	Mellomstørrelse
Gel	Spør	Spør	Spør
Mandreng	2 mm	3,3 mm	4,7 mm
Tape (brun)	Delt i to på langs	Delt i to på langs	Ikke delt

Vedlegg til: Intubasjon og ekstubasjon - barn, Nevrointensiv US (INTI3), id 137183