

Dantrium og Agilus (Dantrolen): beredskapspakke innhold og utblanding:

OBS! Informasjonen på side 1 gjelder preparatet Dantrium (Norgine).
For informasjon om preparatet Agilus (Norgine), se side 2.

Dantrium (Norgine)

Antall: 12 hetteglass à 20 mg

Beredskapspakken skal inneholde:

Esken med Dantrium (dantrolen) tørrstoff, 12 hetteglass og minispike med filter.

50 ml sprøyte, 3 x 20 ml sterilt vann – totalt 12 stk. Fest strikk rundt hver av disse.

50 ml sprøytene har målestrek på 60 ml, som er volumet legemiddelet skal blandes ut i.

Tilberedelse:

Trekk opp 3 x 20 ml sterilt vann, sett på vedlagte minispike med filter og tilsett innholdet til hetteglasset med Dantrium (dantrolen) tørrstoff. Rist løsningen og trekk den opp igjennom den samme minispiken.
Konsentrasjonen er 0,33 mg/ml.

Administrasjon

Dantrium (dantrolen) administreres raskt ved intravenøs bolusinjeksjon.

Holdbarhet

Oppløst tørrstoff skal brukes innen 6 timer og må beskyttes mot lys.
Oppbevares i romtemperatur, IKKE i kjøleskap. OBS! Holdbarhet er inkludert brukstid.

Utblanding av Dantrolen tørrstoff		Org.enhet: Akuttklinikken		Nivå: 2
Versjon: 1	Utarbeidet av: Eirik Hagen (Avdeling klinisk farmasi og rådgivning, Sykehusapotekene Oslo)	Godkj. av:	Dato:	Side 1 av 2

Agilus (Norgine)

Antall: 6 hetteglass á 120 mg (*OBS! Ulik styrke fra Dantrium*)

Beredskapspakken skal inneholde:

Hetteglass med Agilus (dantrolen) tørrstoff, minimum 2 hetteglass
20 ml sprøyte, minispik og 20 ml sterilt vann – 1 stk av hver for hvert
hetteglass

Fest strikk rundt hver av disse.

Tilberedning:

Trekk opp 20 ml sterilt vann, sett på minispik og tilsett innholdet til
hetteglasset med Agilus (dantrolen) tørrstoff. Rist løsningen i ca. 1 minutt
før det inspiseres for partikler. Den rekonstituerte oppløsningen skal ha en
gul-oransje farge og være fri for partikler. Volumet etter utblanding er på
22,6 ml. Konsentrasjonen er 5,3 mg/ml.

Administrasjon

Agilus (dantrolen) administreres raskt ved intravenøs bolusinjeksjon.

Holdbarhet

Oppløst tørrstoff skal brukes innen 24 timer og må beskyttes mot lys.
Oppbevares i romtemperatur, IKKE i kjøleskap. OBS! Holdbarhet er
inkludert brukstid.

Utblanding av Dantrolen tørrstoff		Org.enhet: Akuttklinikken		Nivå: 2
Versjon: 1	Utarbeidet av: Eirik Hagen (Avdeling klinisk farmasi og rådgivning, Sykehusapotekene Oslo)	Godkj. av:	Dato:	Side 2 av 2