

FOR HELSEPERSONELL

- Pasienten behandles med kjemoterapi og står i fare for å utvikle sepsis
- Pasienten skal derfor prioriteres og behandles som øyeblikkelig hjelp
- Pasienten skal ikke vente i mottak, da sepsis kan utvikle seg raskt

Hvis pasienten har feber og er nøyotropen skal antibiotika i.v. startes innen en time



OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS



ØYEBLIKKELIG HJELP KORT: NØYTROPENI

INSTRUKSJON TIL PASIENT

Du behandles med kjemoterapi for din kreftsykdom og kan utvikle en alvorlig infeksjon på grunn av lavt immunforsvar.

HVIS DU HAR ETT ELLER FLERE AV DISSE SYMPTOMENE

- En enkelt temperaturmåling på 38.3 °C eller høyere (rektalt)
- Temperatur 38,0 °C som vedvarer i en time (rektalt)
- Frysninger/frostanfall
- Blødninger
- Raskt forverret allmenntilstand



SØK HJELP UMIDDELBART!

Ikke ta febernedsettende.

Ring ditt lokale sykehus.

Si at du får kjemoterapi, at du kommer inn med mistanke om alvorlig infeksjon og at du har fått beskjed om å prioriteres.