

ISOLERING - KONTAKTSMITTE

INGEN ADGANG UTEN AVTALE MED SYKEPLEIER ELLER LEGE

Bruk følgende personlige beskyttelsesutstyr ved kontakt med pasient, utstyr og inventar

- Hansker
- Smittefrakk
- Munnbind (når avkrysset)



Kjemisk desinfeksjon:

- Desinfeksjonssprit (for rene flater)
- PeraSafe 10 minutter
- PeraSafe 30 minutter

HÅNDEDESINFEKSJON eller HÅNDVASK er påbudt før sykerommet forlates



DØRENE skal holdes lukket

ISOLERING - KONTAKTSMITTE

Isolering ved kontaktsmitte er indisert ved følgende tilstander:

- Mage- tarminfeksjoner som smitter ved fekal- oral smitte, f.eks. Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, enterohemoragisk E.coli (EHEC), Vibrio cholerae, Clostridium difficile, hepatitt A virus, adenovirus, rotavirus og Gardia. Ved infeksjoner med norovirus og mage- tarminfeksjoner med uttalt oppkast og diaré skal det benyttes isolering ved dråpesmitte
- Hud- og sårinfeksjoner forårsaket av Gram negative stavbakterier og med rikelig ukontrollerbar sekresjon
- Kolonisering med MRSA (infeksjoner med MRSA isoleres med luftsmitteregime)
- Infeksjoner og kolonisering med multiresistente Gram negative stavbakterier, (f.eks. bakterier som danner enzymer som ESBL, KPC eller MBL, multiresistente Acinetobacter baumannii o.a.)
- Infeksjoner og kolonisering med vankomycinresistente enterokokker (VRE)
- Ubehandlet skabb

Isoleringsrom: Enerom, helst med forgang (evt. sluse) og kombinert WC/dusj med egen dekontaminator.

Dekontaminering av utstyr og inventar:

- Alt utstyr som tåler varme og senere skal steriliseres, bør rengjøres og desinfiseres i en vaskedekontaminator. Bekken og urinflasker skal desinfiseres i spyledekontaminator.
 - Utstyr og prøveglass/prøvebeholdere som ikke tåler varme desinfiseres med PeraSafe i 10 minutter (30 minutter ved Clostridium difficile).
- Ved bakterielle infeksjoner, unntatt Clostridium difficile, kan det brukes 70 % desinfeksjonssprit dersom det skal desinfiseres er synlig rent, og utstyret tåler det.

Se prosedyre for isolering ved kontaktsmitte for flere detaljer