

Røntgen av magesekk

Ved røntgenundersøkelse av magesekk og tolvfingertarm blir det tatt en serie med bilder etter at pasienten har fått 1-2 glass med flytende kontrastvæske. Hensikten er å kartlegge oppbygning (anatomien) og funksjonen til disse organene.

Av Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus

Hvordan kan jeg forberede meg?

Pasienten må faste og ikke drikke, røyke eller innta tyggegummi og pastiller fra klokken 24.00 natt til undersøkelsesdagen. Er man avhengig av medisiner, skal disse tas med en liten skvett vann. Gi beskjed om dette til den som foretar undersøkelsen.

Dersom du har noen form for kontrastmiddelallergi eller diabetes må du si fra til personalet på sengeposten og på røntgenavdelingen. Si også i fra om hvilke medisiner du bruker hvis du behandles for diabetes. For alle pasienter som har mistenkt eller kjent nedsatt nyrefunksjon og for alle pasienter som er eldre enn 65 år skal det gjennomføres nyrefunksjonsprøver.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Enkelte pasienter får først en sprøyte med et stoff som får magesekken til å slappe av, og ikke trekke seg sammen. Deretter vil pasienten få noen brusetabletter som skal svelges med litt vann. Disse tas for å få luft inn i magesekken. Det er viktig at man ikke raper luften opp igjen. For at organene skal komme godt fram på bildene, vil man få et glass med kontrastvæske som skal svelges. I enkelte tilfeller gis bare kontrastvæske - ikke sprøyte eller brusetabletter (særlig når man leter etter forsnævring i tolvfingertarmen). Bildene tas på samme måte. Legen vil fortelle hvordan pasienten skal snu seg mens bildene tas.

Gjør det vondt?

Undersøkelsen gir vanligvis bare beskjedent ubehag. Kontrastvæsken har en litt emmen smak.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Vanligvis 15 -30 minutter.

Hva skjer etterpå?

Etter at undersøkelsen er ferdig, blir alle bildene vurdert av en lege (radiolog) som lager en skriftlig rapport om hva som ble funnet. Både bildene og rapporten blir lagret på en trygg måte (digitalt). Innliggende pasienter kommer tilbake til avdelingen, mens øvrige kan reise hjem.

Når får jeg resultatet?

Henvissende lege får svar fra avdelingen. Resultatet er klart etter ca. en uke. Innliggende pasienter får vanligvis svar neste dag.

Forholdsregler man må ta

Det anbefales å drikke rikelig et par dager etter undersøkelsen for å "skylle" ut kontrastvæsken.

Bivirkninger og komplikasjoner

I svært sjeldne tilfeller kan noen få lett kløende utslett på kroppen opptil en uke etter å ha fått kontrastvæske. Dette er ufarlig og betyr ikke at du er allergisk. Utslettet kan ved behov behandles med reseptfrie kløestillende midler.

Publisert 25.03.2011 13:46 | Endret 23.04.2014 09:19

Relaterte enheter

Radiologi og nukleærmedisin, Avdeling for