

Time til CT undersøkelse av tynntarmen

Forberedelse til undersøkelsen

CT-undersøkelse av tynntarmen krever et godt samarbeid mellom deg og personalet. For at vi skal kunne utføre undersøkelsen må tynntarmen være tømt. Som regel blir den det etter noen timers fasting. Derfor bør du ikke bruke medikamenter som gir treg mage/forstoppelse, slik som en del smertestillende medisiner eller jerntabletter den siste uken før undersøkelsen. **Andre faste medisiner kan du ta som vanlig (også undersøkelsesdagen).** Spør legen din hvis du er usikker

- **Faste:** Du skal ikke spise fra midnatt undersøkelsesdagen
- **Drikke:** Du kan drikke vann (ikke andre drikker som melk, brus, kaffe osv.)

Informasjon om undersøkelsen

Undersøkelsen er todelt.

- Første del av undersøkelsen gjennomføres på et røntgenlaboratorium. Du får lokalbedøvende gele i nesene. Vi legger så ned en tynn slange via nesene slik at tuppen når ned i øvre del av tynntarmen. Det kan ta noe tid å komme i riktig posisjon. Det kan være nødvendig med endring av leie på bordet. Posisjonen av tuppen av slangen kontrolleres med røntgen.
- Siste del av undersøkelsen gjennomføres på en CT lab. Det kan bli noe venting, men du tas inn til CT-undersøkelsen så snart det er ledig. Under undersøkelsen vil en type kontrastvæske settes inn gjennom slangen. Tynntarmen blir da fylt med væske slik at den kan vurderes i betydelig mer detalj enn i "vanlig" CT av buken.
- Du vil få kontrastmiddel i en blodåre i armen for at organer og blodårer skal komme godt frem på bildene. Ved innsprøyting av kontrastmiddel får mange en varmekølelse i kroppen, metallsmak i munnen og en følelse av å tisse på seg. Dette kan variere i styrke fra person til person, men det går fort over. Kontrastmiddelet skilles ut gjennom nyrene (urinen).

Selve CT-skanningen går raskt og varer kun få sekunder for hver serie. Kontrastmiddelet som settes gjennom sondene kan virke avførende slik at du sannsynligvis vil føle trang til å gå på toalettet mot slutten av, eller etter CT-undersøkelsen.

Etter undersøkelsen

Etter undersøkelsen skal du vente i 30 minutter med kanylen i armen før du forlater avdelingen.

