

NB! Knuse-/delelisten må ikke brukes uavhengig av prosedyreteksten i dokumentet "Tabletter og kapsler –deling, åpning og knusing" (Dok.-ID: 10301)

## Knuse-/delelisten

### A

Abboticin ES Tablett	9 (A, OBS)
Abilify Smeltetablett	15, 18
Abilify Tablett	9
Abstral Sublingvaltablett	7
Acalca Depottablett	1
Acetazolamide Tablett	9
Acetylcystein Brusetablett	17
Acetylsalisylsyre Enterotablett	1
Actelsar HCT Tablett	9
Activelle Tablett	9 (OBS)
Actos Tablett	9
Adalat Tablett	1
Adalat Oros Depottablett	1
Adcirca Tablett	1
Advagraf Depotkapsel	1
Aerius Tablett	9
Aerius Smeltetablett	1, 15, 18
Afi-D2 Forte Kapsel	2
Afinitor Tablett	1 (C)
Afipran Tablett	9
Akineton Tablett	9
Albyl-E Enterotablett	1, 11
Aldactone Tablett	3 (G, OBS)
Alea Tablett	9
Alendronat Tablett	12
Alkeran Tablett	1 (C, G)

Allopur Tablett	9
Aloxi Kapsel	2
Amaryl Tablett	9
Amias Tablett	9
Aminess Tablett	9
Amlodipin Tablett	9
Amoxicillin Oppløselig tablett	1, 9, 17 (A, OBS)
Amoxicillin Tablett	9 (A, OBS)
Amoxicillin Kapsel	10 (A, OBS)
Anafranil Tablett	9
Anastrozole Tablett	9, 15 (OBS)
Andriol Kapsel	2
Angusta Devats Tablett	9 (G, OBS)
Ansatin Kapsel	3 (A, OBS)
Antabus Brusetablett	1, 17
Antepsin Tablett	4, 15
Antidotum Thalli Heyl Kapsel	3, 16
Apocillin Tablett	9 (A, OBS)
Apodorm Tablett	3
Aponova Depotkapsel	5
Apovit B-combin sterk Tablett	9
Apresolin Tablett	9
Aprovel Tablett	9
Aptivus Kapsel	2 (A, OBS)
Aquadeks Tyggetablett	14
Aquadeks Softgels Kapsel	2
Arava Tablett	9 (OBS)
Arcoxia Tablett	9
Aricept Tablett	9
Arimidex Tablett	9, 15 (OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 1 av 16

Aromasin Tablett	9 (OBS)
Arthrotec Depottablett	1
Asacol Enterotablett	1
Asasantin Retard Depotkapsel	5
Aspirin 500 mg Tablett	9
Aspirin 75 mg Oppløselig tablett	9, 17
Aspirin 81mg Tyggetablett	14, 15
Atacand Tablett	9
Atacand Plus/ Atacand Plus Mite Tablett	9
Atarax Tablett	9
Atenolol Tablett	9
Atorvastatin Tablett	9, 15
Atripila Tablett	1 (A)
Attentin Tablett	9
Aurorix Tablett	9
Avelox Tablett	9 (A, OBS)
Avodart Kapsel	12 (OBS)
Azilect Tablett	9
Azitromax Tablett	9 (A, OBS)

## B

Bactrim Tablett	9 (A, OBS)
Baklofen Tablett	9
Baraclude Tablett	9 (A, OBS)
Benerva Tablett	9, 15
Benetor Tablett	9
Benetor Comp Tablett	9
Berocca Brusetablett	9, 17
Betapred Tablett	14, 15 (OBS)
Betmiga Depottablett	1

Bicalutamid Tablett	9 (G, OBS)
Biltricide Tablett	9
Bioclavid Tablett	1 (A)
Bio-E-Vitamin Kapsel	2
Bisolvon Oppløselig tablett	13
Bisolvon Tablett	3
Bisoprolol Tablett	9
Bonefos Tablett	12
Bonviva Tablett	12
Bricanyl Tablett	9
Bricanyl Depot Depottablett	1
Brilique Tablett	9, 15
Brintellix Tablett	9
Bronkyl/ Bronkyl Forte Brusetablett	17
Brufen Retard Depottablett	1
B-total Tablett	9
Buprenorphine Sublingvaltablett	7, 9
Burinex Tablett	9
Buscopan Tablett	9, 15
Buspiron Tablett	9

## C

Calcigran Tyggetablett	14, 15, 19
Calcigran Forte Tyggetablett	14, 15, 19
Calciumfolinat Tablett	9
Calcium-Sandoz Brusetablett	17
Campral Enterotablett	1
Candemox Comp Tablett	9
Candesartan Tablett	9
Candesartan HCT Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Capecitabine Tablett	1 (C, G)	Cisordinol Tablett	9
Captopril Tablett	9	Citalopram Tablett	9
Carbaglu Oppløselig tablett	17	Clarithromycin Tablett	9 (A, OBS)
Cardizem Retard Depottablett	1	Clarityn Tablett	9
Cardizem Uno Depottablett	1	Cliovelle Tablett	9 (OBS)
Carduran CR Depottablett	1	Clopidogrel Tablett	9
Carvedilol Tablett	3	Clozapin Tablett	9
Casodex Tablett	9 (G, OBS)	CoAprovel Tablett	9
Cataflam Tablett	9	Colazid Kapsel	15, 16
Catapresan Tablett	9	Colrefuz Tablett	9 (OBS)
CeeNU Kapsel	10 (C, G)	Combivir Tablett	3 (A, OBS)
Celebra Kapsel	3	Concerta Depottablett	1
Celebrex Kapsel	3	Copegus Tablett	1 (A)
CellCept Kapsel	1 (OBS)	Cordarone Tablett	9
CellCept Tablett	1 (OBS)	Corixil Tablett	9
Celsentri Tablett	1 (A)	Cortef Tablett	9 (OBS)
Centyl med kaliumklorid Tablett	1	Cortisonacetat Tablett	9 (OBS)
Centyl mite med kaliumklorid Tablett	1	Cozaar Tablett	9, 15
Certican Tablett	1	Cozaar Comp Tablett	9, 15
Certican Oppløselig tablett	17 (OBS)	Cozaar Comp Forte Tablett	9, 15
Cetimax Tablett	9	Creon Enterokapsel	6
Cetitizin Tablett	9	Crestor Tablett	9, 15
Chlorpromazine Tablett	1	Crixivan Kapsel	1 (A)
Cholestagel Tablett	9	C-vitamin Brusetablett	17
Cinaclet Tablett	1	Cycloserine Kapsel	10 (A, OBS)
Cipralax Tablett	9	Cyklokapron Tablett	9
Cipramil Tablett	9	Cymbalta Enterokapsel	6
Ciprofloxacin Tablett	9 (A, OBS)	Cytotec Tablett	9 (G, OBS)
Ciproxin Tablett	9 (A, OBS)		
Circadin Depottablett	1		

**1:** Svelges hel.

**2:** Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.

**3:** Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.

**6:** Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.

**9:** Kan om nødvendig deles eller knuses.

**10:** Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.

**11:** Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.

**12:** Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**14:** Tygges. Kan deles/knuses.

**15:** Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**16:** Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.

**17:** Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**18:** Smeltes på tungen, og svelges.

**19:** Kan suges.

**20:** Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**(A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

**(G):** Skal ikke håndteres av gravide.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 3 av 16

**D**

D3-vitamin Tablett	9
Daklinza Tablett	9 (A, OBS)
Dalacin Kapsel	12 (A, OBS)
Danol Kapsel	1
Dapson Tablett	9 (A, OBS)
Daraprim Tablett	9
Daxas Tablett	9
Dekristol Kapsel	2
Depakote Sprinkle Enterokapsel	15
Deprakine Enterotablett	1
Descovy Tablett	1 (A)
Detrusitol SR Depotkapsel	5
Dexamethason Tablett	9 (OBS)
Diamox Tablett	9
Diamox SR Depotkapsel	1
Diclin Kapsel	10, 15 (A, OBS)
Diclofil Kapsel	10, 15 (A, OBS)
Diclofenac Enterotablett	1
DiclofenacKalium Tablett	9
Dicloxacillin Kapsel	10, 15 (A, OBS)
Dicuno Tablett	4
Dificlir Tablett	9, 15 (A)
Diffucan Kapsel	10 (A, OBS)
Digimerck Pico Tablett	9
Digoxin Tablett	9
Diovan Tablett	9
Diovan Comp Tablett	9
Disprin Oppløselig tablett	17

Diural Tablett	9, 15
Dociton Retard Depotkapsel	5
Doksycyklin Tablett	12, 15 (A, OBS)
Dolcontin Depottablett	1
Donepezil Tablett	9
Dormicum Tablett	9
Dostinex Tablett	9, 15
Doxylin Tablett	12, 15 (A, OBS)
Dulcolax Enterotablett	1
Duloxetin Enterokapsel	6
Duodart Kapsel	12 (OBS)
Durbis Retard Depottablett	4
Duroferon Duretter Depottablett	1

**E**

Ebastin Tablett	9
Ebixa Tablett	9
Edurant Tablett	1 (A)
Efavirenz Tablett	9 (A, OBS)
Efexor Depot Depotkapsel	5
Efient Tablett	9
Egazil Duretter Depottablett	1
Ekvacillin Tablett	9 (A, OBS)
Eldepryl Tablett	9, 15
Eliquis Tablett	9, 15
Elvanse Kapsel	3
Emconcor/Emconcor CHF Tablett	9
Emend Kapsel	15
Emselex Depottablett	1
Emtriva Kapsel	1 (A)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererfrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Enalapril Tablett	3
Enalapril Comp Tablett	9
Enalapril HCT Tablett	9
Entocort Depotkapsel	5
Epclusa Tablett	9 (A, OBS)
Epivir Tablett	3 (A, OBS)
Eplerenon Tablett	9
Equasym Depot Depotkapsel	5
Eremfat Tablett	9 (A, OBS)
Ery-Max Enterokapsel	5 (A, OBS)
Escitalopram Tablett	9
Esidrex Tablett	9
Esomeprazol Enterokapsel	5
Esopral Enterotablett	1, 20
Etalpa Kapsel	2
Eucreas Tablett	9
Eviplera Tablett	1 (A)
E-vitamin Kapsel	2
Evotaz Tablett	1 (A)
Exelon Kapsel	1
Exemestan Tablett	9 (OBS)
Exforge Tablett	9
Exforge HTC Tablett	9
Exjade Oppløselig tablett	13
Exviera Tablett	1 (A)
Ezetrol Tablett	9

## F

Felodipin Depottablett	1
Femar Tablett	9 (OBS)

Femara Tablett	9 (OBS)
Fenazon-Koffein/ Fenazon-Koffein sterke Tablett	9
Fenemal Tablett	9
Ferromax Tablett	1
Ferro-Retard Depottablett	1
Fevarin Tablett	12
Finasterid Tablett	9, 15 (G, OBS)
Flagyl Tablett	9 (A, OBS)
Flecainid Tablett	9
Florinef Tablett	9 (OBS)
Fluanxol Tablett	9, 15
Fluconazol Kapsel	10 (A, OBS)
Fludara Tablett	1 (C, G)
Fluoxetin Kapsel	15
Fluoxetin Oppløselig tablett	20
Flutamid Tablett	9
Folsyre NAF 1 mg Tablett	9
Fontex Oppløselig tablett	20
Fortecortin Tablett	9 (OBS)
Forxiga Tablett	1
Fosamax Tablett	12
Fosrenol Tyggetablett	14
Frisium Tablett	9, 15
Fucidin Tablett	9 (A, OBS)
Furadantin Tablett	9, 15 (A, OBS)
Furix Tablett	9, 15
Furix Retard Depotkapsel	5
Furosemid Tablett	9, 15
Fycompa Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

## G

Galantamin Depotkapsel	5
Galvus Tablett	9
Gaviscon Tyggetablett	14
Genvoya Tablett	1 (A)
Glaupax Tablett	9
Glibenclamid Tablett	4
Glimepirid Tablett	9
Glivec Tablett	4, 15 (C)
Glucophage Tablett	9
Glucosamin Tablett	9
Granisetron Tablett	9, 15
Grazax Smeltetablett	7

## H

Haldol Tablett	9
Harvoni Tablett	9 (A, OBS)
Heminevrin Kapsel	1
Hepsera Tablett	9, 15 (A, OBS)
Hiprex Tablett	9 (A, OBS)
Hycamtin Kapsel	1 (C, G)
Hydrea Kapsel	3 (C, G)
Hydrochlorothiazide Tablett	9
Hydrocortisone Tablett	9 (OBS)
Hydrokon Tablett	9
Hydroxyurea Kapsel	3 (C, G)

## I

Ibandronsyre Tablett	12
Ibumax Tablett	9, 15
Ibumetin Tablett	9, 15
Ibux Kapsel	2
Ibux Tablett	9, 15
Imacillin Tablett	9, 15 (A, OBS)
Imatinib Tablett	4, 15 (C)
Imdur Depottablett	4
Imigran Tablett	9
Imigran Radis Tablett	9, 15
Imodium Tablett	9, 15
Imogas Kapsel	2
Imovane Tablett	9
Imurel Tablett	9 (G, OBS)
Inderal Tablett	9
Indomet Kapsel	15
Inegy Tablett	9
Inexium Enterotablett	1, 20
Infloran Kapsel	15
Inspra Tablett	9
Intelence Tablett	15 (A, OBS)
Invirase Tablett	9 (A, OBS)
Irbesartan Tablett	9
Irbesartan HCT Tablett	9
Iressa Tablett	20 (C)
Isentress Tyggetablett	14 (A, OBS)
Isentress Tablett	1 (A)
Ismo Tablett	1

**1:** Svelges hel.

**2:** Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.

**3:** Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.

**4:** Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.

**5:** Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.

**6:** Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).

**7:** Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.

**8:** Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.

**9:** Kan om nødvendig deles eller knuses.

**10:** Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.

**11:** Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.

**12:** Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.

**13:** Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**14:** Tygges. Kan deles/knuses.

**15:** Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**16:** Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.

**17:** Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**18:** Smeltes på tungen, og svelges.

**19:** Kan suges.

**20:** Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**(A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt.

Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrier refrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

**(G):** Skal ikke håndteres av gravide.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 6 av 16

Ismo Retard Depottablett	1
Isoniazid NAF Tablett	9 (A, OBS)
Isoptin Tablett	9
Isoptin Mite Tablett	9
Isoptin Retard Depottablett	4
Isosorbidmononitrat Tablett	9
Isotretinoin Kapsler	2 (OBS)
Ixoten Tablett	1 (C, G)

## J

Jakavi Tablett	9 (C)
Janumet Tablett	9, 15
Januvia Tablett	9, 15

## K

Kalcipos-Vitamin D Tablett	9, 15
Kaleorid Depottablett	1
Kaletra Tablett	1 (A)
Kaliumjodid Tablett	9, 15
Kaliumklorid Depottablett	1
Kalsium Tyggetablett	14, 15, 19
Kalsium m/vit D3 Tyggetablett	14, 15, 19
Kandesartan Tablett	9
Kandesartan HCT Tablett	9
Keflex Tablett	9 (A, OBS)
Keppra Tablett	9
Kestine Tablett	9
Kettesse Tablett	9
Ketorax Tablett	9

Ketovite Tablett	3
Kivexa Tablett	3 (A, OBS)
Klacid OD Depottablett	1 (A)
Klomipramin Tablett	9
Kodein Tablett	9
Kohle-Compretten Tablett	15
Kolkisin Tablett	9 (OBS)
Kredex Tablett	3
Kreon Enterokapsel	6
Kuvan Oppløselig tablett	9, 17

## L

Lamictal Oppløselig tablett/Tyggetablett	14, 17
Lamisil Tablett	9 (A, OBS)
Lanoxin Tablett	9
Lansoprazol Enterokapsel	5
Lanvis Tablett	9 (C, G)
Lanzo Melt Smeltetablett	1, 18, 19, 20
Largactil Tablett	1
Lariam Tablett	9, 15
Lasix Retard Depotkapsel	5
Latuda Tablett	9
Leflunomide Tablett	9 (OBS)
Leponex Tablett	9
Lerkanidipin Tablett	9
Lescol Kapsel	1
Lescol Depot Depottablett	1
Letrozol Tablett	9 (OBS)
Leukeran Tablett	1 (C, G)
Levaxin Tablett	9, 15

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrier refrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 7 av 16

Levomepromazine Tablett	9
Linezolid Tablett	9, 15 (A, OBS)
Lioresal Tablett	9
Liothyronin Tablett	9
Lipitor Tablett	9, 15
Lisinopril Tablett	9
Lisinopril HTC Tablett	9
Liskantin Tablett	9
Lithionit Depottablett	4
Lixiana Tablett	9
Lodoz Tablett	9
Lomir Tablett	9
Lomir SRO Depotkapsel	1
Lomustine Kapsel	10 (C, G)
Loniten Tablett	9
Loperamid Kapsel	3, 15
Lopid Kapsel	15
Loratadin Tablett	9
Losartan Tablett	9, 15
Losartan HTC Tablett	9, 15
Losec Mups Enterotablett	20
Lovastatin Tablett	9, 15
Lymecyclin Kapsel	12 (A, OBS)
Lyrica Kapsel	3, 15

Malarone Tablett	3
Malarone Junior Tablett	3
Malfin Depottablett	1
Marevan Tablett	9
Marevan u/farge Tablett	9
Marzine Tablett	9
Maxalt Tablett	1
Maxalt Rapitab Smeltetablett	15, 18
Medikinet Tablett	9
Medikinet Depotkapsel	5
Medrol Tablett	9, 15 (OBS)
Melatonin Kapsel	3
Melatonin PR Depottablett	1
Meloxicam Tablett	9
Memantin Tablett	9
Mestinon Tablett	9
Metadon Tablett	9, 15
Metamina Tablett	9
Metformin Tablett	9
Methotrexate Tablett	4, 15 (C, G)
Methylidopa Tablett	9
Methylphenidate Depottablett	1
Methylprednisolone Tablett	9, 15 (OBS)
Metoclopramide Tablett	9
Metoprolol Tablett	9
Metoprolol Sandoz Depottablett	4, 20
Metronidazol Tablett	9 (A, OBS)
Mexiletine Kapsel	10
Mezavant Enterodepottablett	1
Micardis Tablett	9, 15

## M

Madopar Kapsel	15
Madopar Depot Depotkapsel	1
Madopar Solubile Oppløselig tablett	17
Magnesium Tyggetablett	14

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererfrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.



MicardisPlus Tablett	9
Mifepristone Tablett	9 (G)
Miktosan Depotkapsel	1
Mimpara Tablett	1
Mindiab Tablett	9, 15
Minifom Kapsel	2
Minirin Smeltetablett	7
Mirtazapin Smeltetablett	1, 15, 18
Mirtazapin Tablett	9
Mobic Tablett	9
Moclobemid Tablett	9
Modiodal Tablett	9
Moduretic Mite Tablett	9
Mogadon Tablett	3
Monoket OD Depotkapsel	5
Montelukast Tablett	3
Montelukast Tyggetablett	14
Morfin Tablett	9
Motilium Tablett	9
Moxonidin Tablett	9
Mucomyst Brusetablett	17
Multaq Tablett	3
Myambutol Tablett	9 (A, OBS)
Myfenax Kapsel	1 (OBS)
Myfenax Tablett	1 (OBS)
Myfortic Enterotablett	1 (OBS)
Mykofenolat Kapsel	1 (OBS)
Myleran Tablett	1 (C, G)

## N

Naltrexone Tablett	9
Napren-E Enterotablett	1
Naproxen Tablett	9
Naproxen-E Enterotablett	1
Naramig Tablett	9
Natriumklorid Tablett	9
Natron NAF Tablett	3
Natulan Kapsel	1
Navelbine Kapsel	1 (C, G)
Navoban Kapsel	10
Naxogin Tablett	9 (OBS)
Nemdatine Tablett	9
Neo-Mercazole Tablett	9
Neotigason Kapsel	10 (OBS)
Neurontin Tablett	3
Neurontin Kapsel	3
Nexavar Tablett	1 (C)
Nexium Enterotablett	1, 20
Niaspan Depottablett	1
Nicorette Sugetablett	19
Nicotinell Sugetablett	19
Niferex Enterokapsel	5
Nimoral Tablett	9 (OBS)
Nimotop Tablett	1
Nitroglycerin Sublingvaltablett	7
Nobligan Kapsel	3
Nobligan Retard Depottablett	1
Nolvadex Tablett	9, 15 (G, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 9 av 16

Normix Tablett	3, 16 (A)
Normorix Mite Tablett	9
Norprolac Tablett	9
Norvasc Tablett	9
Norvir Tablett	1 (A)
Noskapin Tablett	9
Novaluzid Tyggetablett	14
Noxafil Enterotablett	1 (A)
Nozinan Tablett	9, 15
Nuelin Depot Depottablett	4
Nycoplus B-Total Tablett	9
Nycoplus C-vitamin Brusetablett	17
Nycoplus C-vitamin Tablett	9
Nycoplus D3-vitamin Tablett	9
Nycoplus E-vitamin Kapsel	2
Nycoplus Ferro-Retard Depottablett	1
Nycoplus Folsyre 0,4 mg Tablett	9
Nycoplus Magnesium Tyggetablett	14
Nycoplus Multivitaminer Tablett	9
Nycoplus Selen med E-vitamin Tablett	9

## O

Odefsey Tablett	1 (A)
Olanzapin Smeltetablett	1, 15, 18
Olanzapin Tablett	9
Olmotec Tablett	9
Olmotec Comp Tablett	9
Olysio Kapsel	1 (A)
Omacor Kapsel	2
Omeprazol Enterokapsel	6

Omic Depottablett	1
Ondansetron Smeltetablett	9, 15, 18
Ondansetron Tablett	9
Onglyza Tablett	1
Oprymea Tablett	9
Opsumit Tablett	1
Optinate Septimum Tablett	12
Orfiril Enterotablett	1
Orfiril Long Depotkapsel	5
Orfiril Retard Depottablett	1
Orodek Tablett	9
Orudis Depotkapsel	5
Ospolot Tablett	3
Ovesterin Tablett	9 (OBS)
Oxycodone Kapsel	15
OxyContin Depottablett	1
Oxydorine Depottablett	1
OxyNorm Kapsel	10

## P

Palexia Tablett	9
Palexia Depot Depottablett	1
Palladon Kapsel	3
Palladon Depotkapsel	5
Pamol Tablett	9
Pamol Smeltetablett	15, 18
Panodil Tablett	9
Panodil Zapp Tablett	9
Pantoprazol Enterotablett	1
Paracet Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Paracet Brusetablett	17
Paracet Smeltetablett	15, 18
Paralgin Forte Tablett	9
Paramax Tablett	9
Paramax Comp Tablett	9
Paricalcitol Kapsel	2
Parlodel Tablett	9
Paroxetin Tablett	9
Penomax Tablett	9 (A, OBS)
Pentasa Depottablett	4, 20
Perigona Tablett	9
Perphenazin Tablett	9
Persantin Tablett	9
Persantin Retard Depotkapsel	5
Peteha Tablett	9, 15 (A, OBS)
Phenergan Tablett	9, 15
Phenytoin AWD Tablett	3
Phosphate-sandoz Brusetablett	17
Physiotens Tablett	9
Pinex Tablett	9
Pinex Smeltetablett	15, 18
Pinex Brusetablett	9, 17
Pinex Forte Brusetablett	17
Pinex Forte Tablett	9
Pioglitazone Tablett	9
Plaquenil Tablett	9
Plavix Tablett	9
Plendil Depottablett	1
Polaramin Tablett	9
Postafen Tablett	9

Pradaxa Kapsel	1
Pramipexol Tablett	9
Pranolol Tablett	9
Pravachol Tablett	9
Pravastatin Tablett	9
Precosa Kapsel	3
Prednisolon Tablett	9 (OBS)
Prednisolone Oppløselig tablett	1, 17 (OBS)
Prezista Tablett	9 (A, OBS)
Primaquine Phosphat Tablett	9
Probecid Tablett	9
Prograf Kapsel	3 (OBS)
Progynova Tablett	9 (OBS)
Propal Retard Depotkapsel	5
Propranolol Tablett	9
Proscar Tablett	9, 15 (G, OBS)
Provaqomyl Tablett	9
Provera Tablett	9 (OBS)
Proxan Tablett	9
Puri-Nethol Tablett	4 (C, G)
Pursennid Tablett	9
Pyrazinamid Tablett	9 (A, OBS)
Pyridoksin NAF Tablett	9

## Q

Quetiapin Depottablett	1
Quetiapin Tablett	9

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 11 av 16

**R**

Ramipril Tablett	9
Ranitidin Tablett	9
Rapamune Tablett	1
Rasilez Tablett	9
Rebetol Kapsel	1 (A)
Relifex Oppløselig tablett	17
Relifex Tablett	9
Relpax Tablett	9
Reltebon Depottablett	1
Remeron Tablett	9
Remeron-S Smeltetablett	1, 15, 18
Reminyl Depotkapsel	5
Renagel Tablett	1
Renavit Tablett	9
Renitec Tablett	9
Renitec Comp/ Renitec Comp Mite Tablett	9
Renvela Tablett	1
Requip Tablett	9, 15
Requip Depot Depottablett	1
Resochin Tablett	9
Revatio Tablett	9
Revlimid Kapsel	1 (OBS)
Revolade Tablett	1
Reyataz Kapsel	6 (A, OBS)
Rezolsta Tablett	1 (A)
Riamet Tablett	9
Rifater Tablett	1 (A)
Rifinah Tablett	9 (A, OBS)

Rilutek Tablett	9
Riluzol Tablett	9
Rimactan Kapsel	3 (A, OBS)
Rimactazid Tablett	9 (A, OBS)
Rimcure Tablett	1 (A)
Rimstar Tablett	1 (A)
Rinexin Depottablett	1
Risperdal Smeltetablett	15, 18
Risperdal Tablett	9, 15
Risperidon Tablett	9, 15
Ritalin Depotkapsel	5
Ritalin Tablett	9
Rivastigmin Kapsel	1
Rivotril Tablett	9
Rocaltrol Kapsel	2
Ropinirol Tablett	9, 15
Ropinirol Depottablett	1

**S**

Sabrilix Tablett	3 (OBS)
Salazopyrin EN Enterotablett	1
Samin Tablett	9
Samsca Tablett	9, 15
Sandimmun Neoral Kapsel	1
Sarotex Tablett	9
Sarotex Retard Depotkapsel	5
Sebivo Tablett	9, 15 (A, OBS)
Selen med E-vitamin Tablett	9
Selexid Tablett	9 (A, OBS)
Selo-Zok Depottablett	4, 20

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Sendoxan Tablett	1 (C, G)
Serdolect Tablett	9
Seroquel Tablett	9
Seroquel Depot Depottablett	1
Seroxat Tablett	9
Sertralin Tablett	9, 15
Sevelamer Tablett	1
Sevikar Tablett	9
Sifrol Tablett	9
Sifrol Depottablett	1
Simvastatin Tablett	9, 15
Sinalfa Tablett	9
Sinemet Tablett	9, 15
Sinemet Depot Mite Depottablett	1
Sinequan Kapsel	15
Singulair Tablett	3
Singulair Tyggetablett	14
Sirturo Tablett	9 (A, OBS)
Sivextro Tablett	9 (A, OBS)
Sobril Tablett	9, 15
Solian Tablett	9
Solupred Brusetablett	9, 17 (OBS)
Solvezink Brusetablett	9, 17
Somac Enterotablett	1
Sorbangil Tablett	8
Sotacor Tablett	9, 15
Sotalol Tablett	9, 15
Sovaldi Tablett	9 (A, OBS)
Spiricort Tablett	9 (OBS)
Spirix Tablett	3 (G, OBS)

Spironolakton Tablett	3 (G, OBS)
Sporanox Kapsel	1 (A)
Sprycel Tablett	1 (C)
Stalevo Tablett	9, 16
Stemetil Tablett	9
Stesolid Tablett	9
Stilnoct Tablett	9
Stilnox Tablett	9
Stocrin Tablett	9 (A, OBS)
Strattera Kapsel	1
Stribild Tablett	1 (A)
Suboxone Sublingvaltablett	7, 9
Subutex Sublingvaltablett	7, 9
Sulfadiazine Tablett	9 (A, OBS)
Sumatriptan Tablett	9
Surmontil Tablett	9

## T

Tacni Kapsel	3 (OBS)
Tagrisso Tablett	15 (C)
Tambocor Tablett	9
Tambocor Retard Depotkapsel	5
Tamiflu Kapsel	3 (A, OBS)
Tamoxifen Tablett	9, 15 (G, OBS)
Tamsulosin Depottablett	1
Tamsulosin Depotkapsel	1
Targiniq Depottablett	1
Targretin Kapsel	1, 2 (C, G)
Tarivid Tablett	9 (A, OBS)
Tasigna Kapsel	6 (C)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Tavanic Tablett	9 (A, OBS)
Tegretol Tablett	9, 15
Tegretol Retard Depottablett	4, 20
Telfast Tablett	9
Telmisartan Tablett	9, 15
Temesta Tablett	9, 15
Temgesic Sublingvaltablett	7, 9
Temodal Kapsel	6 (C, G)
Temomedac Kapsel	6 (C, G)
Temozolomid Kapsel	6 (C, G)
Tenofovir disoproksil Tablett	9, 15 (A, OBS)
Tenormin Tablett	9
Terbinafin Tablett	9 (A, OBS)
Tetracyclin Kapsel	15 (A, OBS)
Tetracyclin Tablett	15 (A, OBS)
Tetralysal Kapsel	12 (A, OBS)
Teveten Tablett	9
Teveten Comp Tablett	1
Thalidomide Kapsel	1 (G)
Theo-Dur Depottablett	4
Tiamin Tablett	9, 15
Titralac Tablett	14, 18
Tivicay Tablett	9 (A, OBS)
Toilax Enterotablett	1
Tolvon Tablett	9
Topimax Kapsel	5
Topimax Tablett	9
Topiramet Tablett	9
Toviaz Depottablett	1
Tracleer Tablett	9, 15 (OBS)

Trajenta Tablett	9, 15
Tramadol Kapsel	3
Tramagetic OD Depottablett	1
Tramagetic Retard Depottablett	1
Trampalgin Tablett	4
Trandate Tablett	3
Trental Depottablett	1
Triatec Tablett	9
Trilafon Tablett	9
Trileptal Tablett	9, 15
Trimetoprim Tablett	9 (A, OBS)
Trimonil Retard Depottablett	4, 20
TrioBe Tablett	9
Triumeq Tablett	9 (A, OBS)
Trizivir Tablett	1 (A)
Truvada Tablett	9, 15 (A, OBS)
Truxal Tablett	9
Tyverb Tablett	1 (C)

## U

Uptravi Tablett	9, 15
Urocit-k Depottablett	1
Uromitexan Tablett	9
Ursochol Kapsel	3
Ursodeoksykolsyre Kapsel	3
Ursofalk Kapsel	3

## V

Valaciclovir Tablett	9 (A, OBS)
----------------------	------------

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Valcyte Tablett	1 (A, OBS)
Valganciclovir Tablett	1 (A, OBS)
Valium Tablett	9
Vallergan Tablett	9
Valsartan Tablett	9
Valsartan HCT Tablett	9
Valtrex Tablett	9 (A, OBS)
Vancomycin Kapsel	1 (A)
Vanquin Tablett	16
Velphoro Tyggetablett	14
Venlafaxin Depotkapsel	5
Venlix Tablett	9
Venorion Depotkapsel	5
Vepesid Kapsel	2 (C, G)
Vesanoid Kapsel	2 (C, G)
Vesicare Tablett	9 (OBS)
Vfend Tablett	9 (A, OBS)
Viagra Tablett	9, 15
Viekirax Tablett	1 (A)
Vimovo Tablett med modifisert frisetting	1
Vimpat Tablett	9, 15
Viramune Depottablett	1 (A)
Viramune Tablett	9 (A, OBS)
Viread Tablett	9, 15 (A, OBS)
Vival Tablett	9
Vivotif Enterokapsel	1
Volibris Tablett	9 (OBS)
Voltaren Enterotablett	1
Voltarol Kapsel	2
Votrient Tablett	1 (C)

## W

Weifa C-vitamin Brusetablett	17
Weifa Kalsium Tyggetablett	14, 15, 19
Weifa Kalsium m/D-vit Tyggetablett	14, 15, 19
Weifapenin Tablett	9 (A, OBS)
Wellbutrin Retard Depottablett	1

## X

Xalkori Kapsel	1 (C)
Xanor Tablett	9
Xanor Depot Depottablett	1
Xarelto Tablett	9, 15
Xatral Depottablett	1
Xeloda Tablett	1 (C, G)
Xenical Kapsel	10
Xifaxan Tablett	3, 16 (A)
Xyzal Tablett	9

## Z

Zanidip Tablett	9
Zantac Brusetablett	17
Zantac Tablett	9
Zavesca Kapsel	15
Zebinix Tablett	9
Zeffix Tablett	3 (A, OBS)
Zeldox Kapsel	1
Zemplar Kapsel	2
Zentel Tablett	9, 15

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

- (A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).
- (C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekkskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barriererefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).
- (G):** Skal ikke håndteres av gravide.
- (OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekkskap/sikkerhetsbenk.

Zentel Tyggetablett	3, 14
Zepatier Tablett	1 (A)
Zestoretic Tablett	9
Zestoretic Mite Tablett	9
Zestril Tablett	9
Ziagen Tablett	3 (A, OBS)
Ziprasidon Kapsel	1
Zocor Tablett	9, 15
Zofran Smeltetablett	9, 15, 18
Zofran Tablett	9
Zolmitriptan Smeltetablett	18
Zolmitriptan Tablett	1
Zolofit Tablett	9, 15
Zolpidem Tablett	9
Zomig Tablett	9
Zomig Rapimelt Smeltetablett	18
Zonegran Kapsel	3 (OBS)
Zopiklon Tablett	9
Zopitin Tablett	9
Zovirax Tablett	9 (A, OBS)
Zyban Depottablett	1
Zyloric Tablett	9
Zyprexa Tablett	9
Zyprexa Velotab Smeltetablett	1, 15, 18
Zyrtec Tablett	9
Zyvoxid Tablett	9, 15 (A, OBS)

- 1: Svelges hel.
- 2: Inntas hel i munnen på grunn av flytende innhold.
- 3: Kapselen kan åpnes/tabletten kan knuses eller deles, og innholdet blandes med vann uten kullsyre, eller halvfast mat. Eks. yoghurt, moden banan eller eplesaus. Bør skylles ned med vann etterpå.
- 4: Svelges hel eller delt (bare etter delestrek), må ikke tygges eller knuses.
- 5: Kapselen kan om nødvendig åpnes, men innholdet må svelges helt. Kornene må ikke tygges eller knuses.
- 6: Skal ikke knuses eller tygges. Kapselen kan åpnes og innholdet blandes ut i syreholdig væske (eks. eplejuice).
- 7: Legges under tungen og beholdes der inntil legemiddelet er oppløst.
- 8: Tygges/knuses kun ved anfall. Svelges hel eller delt (bare etter delestrek) ved forebyggende behandling.
- 9: Kan om nødvendig deles eller knuses.
- 10: Kan om nødvendig åpnes forsiktig og innholdet gis på en skje.
- 11: Ved akutt/truende hjerteinfarkt/TIA bør 1.dose deles, knuses eller tygges.
- 12: Tabletten svelges hel eller delt (bare etter delestrek)/kapselen svelges hel for å unngå irritasjon/sårhet på hud eller slimhinner i munnhule og spiserør.
- 13: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. Oppløsningen skal røres før den drikkes. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 14: Tygges. Kan deles/knuses.
- 15: Kapselen kan åpnes/tabletten kan røres ut i vann uten kullsyre. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 16: Bør svelges hel for å unngå misfarging i munnen.
- 17: Løses i ½ glass vann uten kullsyre før inntak. For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.
- 18: Smeltes på tungen, og svelges.
- 19: Kan suges.
- 20: Kan røres ut i vann uten kullsyre. Kornene må ikke tygges eller knuses. Vær oppmerksom på at legemiddelet ikke alltid vil løses fullstendig opp (dvs. klar løsning). For å sørge for at man har fått i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset og drikke også dette vannet.

**(A): Antimikrobielle og antivirale legemidler.** Kan gi sensibilisering av helsepersonell/utvikling av allergi, og risiko for resistensutvikling, se prosedyre (Dokument-ID: 10316).

**(C): Cytostatika og proteinkinasehemmere.** Helsepersonell bør ikke berøre tabletter eller kapsler uten hansker. Hendene må vaskes før og etter at hanskene er brukt. Avtrekksskap (eller sikkerhetsbenk), samt doble hansker og barrierefrakk benyttes ved manipulering av tabletter eller kapsler, se prosedyre (DokumentID: 3301).

**(G):** Skal ikke håndteres av gravide.

**(OBS):** Av hensyn til den ansattes arbeidsmiljø anbefales det å bruke engangshansker og arbeide i avtrekksskap/sikkerhetsbenk.

Knuse-/delelisten	Org. enhet: Oslo Universitetssykehus HF	Nivå 1
Versjon: 5	Utarbeidet av: Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo	Godkj. av: Kjell Magne Tveit
	Dato: 31.08.2017	Side 16 av 16