

Rekvirent

Legenavn

HPR-nr.

Enhet/Legekontor

Adresse

Telefon

Postnr.

Poststed

Kortkode/
Rekv.kode

Pasient

Fødselsdato

Personnr.

Kvinne

Mann

Etternavn - fornavn

Adresse

Poliklinisk

Inneliggende

Postnr.

Poststed

Rom-seng

Kopi av svar sendes til

Legenavn

Avdeling/Legekontor

Adresse

Postnr./sted

HPR-nr.

Prøvetakingstidspunkt

DDMMÅÅ
TTMM

Prøvetakers signatur

NIPT er en undersøkelse av fosterets DNA (fritt føtalt DNA) i mors blodprøve. Resultatet angir lav eller økt sannsynlighet for trisomi 13,18 og 21 hos fosteret. Blodprøve av mor kan tas fra svangerskapsuke 10+0

Graviditetslengde på prøvetakningsdato:

UKER: (kryss av)

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42							

DAGER: (kryss av)

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

Tvillinger (eventuelt chorionisitet)?

Ja ☐

Nei ☐

Organ- eller benmargstransplantasjon hos mor?

Ja ☐

Nei ☐

Hvis ja, spesifiser:

Immunterapi eller kreftsykdom hos mor i løpet av de siste 3 mnd?

Ja ☐

Nei ☐

Høyde: _____ cm Vekt: _____ Kg

For laboratoriet

☐ Prioritet

☐ Streck-rør

☐ Annet:

Dato og sign:

Internkoder:

Kommentarer:

Ultralydfunn og øvrige opplysninger (mistanke om kjønnskromosomavvik).

Telefonnummer til rekvirent (for patologiske prøvesvar):

Prøvemateriale og prøvetaking

- Type rør: Streck-rør "Cell-Free DNA BCT® CE". Prøverørene bestilles på www.nordicbiosite.com.
- Streck-rør tas etter EDTA-rør og før rør med glykolysehemmer. Dersom Streck-rør tas etter et heparin-rør, er det anbefalt å ta et EDTA-rør uten tilsetning etter dette. For mer informasjon, se Cell-Free DNA BCT RUO CE/01_Instructions.
- Røret fylles med 7-10 ml blod (fylles over rød strek). Vend røret forsiktig 8-10 ganger etter prøvetaking.
- Prøven skal ikke sentrifugeres, og må ikke fryses.
- Etter prøvetaking oppbevares prøven i romtemperatur før forsendelse. Ved feil prøvehåndtering vil det bli bedt om en ny prøve.
- Laboratoriet må få prøven innen 3 dager etter prøvetaking.
- Prøven transporteres i romtemperatur (4-30 grader).

For mer informasjon om prøvetaking, se brukerhåndboken til Avdeling for medisinsk genetikk (ous.labfag.no)

For mer informasjon om NIPT-analysen, se www.helsenorge.no.

Animasjonsfilm om NIPT finner man også på hjemmesiden til Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus.