



Til bruk på Rikshospitalet,
Radiumhospitalet
og tilhørende steder

Til medarbeider og leder!

Denne **Stikkskadekonvolutten** skal sikre rask informasjon/oppfølging til ansatte som har

- stukket seg på urene sprøytespisser eller andre skarpe gjenstander eller
- blitt utsatt for søl av blod eller blodholdige kroppsvæsker på sår, rifter eller slimhinner

Du finner det du trenger i denne konvolutten

(Instruksen ”Stikkskadeoppfølging”, plakat/flytskjema, rekvisisjoner for prøver av smittekilde og ansatt samt skjemaet ”Melding om stikkskade”)

Dette må gjøres:		Hvem?	Når?	Utfyllende:
1.	Strakstiltak/førstehjelp	Den ansatte	Straks	Se instruksens *, pkt. 4.1
2.	Vurder/dokumenter smittekildens (pasientens) smittestatus og iverksette evt. tiltak ut fra dette	Tilstedeværende leder + ansv. lege	Innen noen få timer	Se instruksens *, pkt. 4.2
3.	Det tas blodprøver av den ansatte («0-prøve»)	Ansatt og leder	Innen ca. ett døgn	Se instruksens *, pkt. 4.2
4.	Meld skaden som HMS-hendelse (elektronisk)	Ansatt	Innen ca. ett døgn	Se forklaring nedenfor
5.	«Melding om stikkskade» (papirskjema) sendes inn til Arbeidsmiljøavdelingen, Forskningsveien 2B (NB! lukket konvolutt)	Ansatt og leder	Innen ca. ett døgn	Skjema ligger som side 7 i denne konvolutten
6.	Ved behov for informasjon, kontakt Arbeidsmiljøavdelingen	Ansatt, leder, andre	Hverdager 10 - 14	Telefon: 230 75880

* Instruksens ”Stikkskadeoppfølging” – ligger i stikkskadekonvolutten og finnes i e-Håndbok

Slik meldes HMS-avvik:

1. Åpne **OUS virksomhetsportal** på skrivebordet.
2. Gå til **Achilles – forbedringssystemet** via «Tjenester» til høyre på forsiden.
3. Velg **HMS-hendelse** (i midten), trykk på «Registrer ny» og skjemaet «Registrering av HMS-sak» kommer opp.
4. **Registrer og beskriv hendelsen.** NB! Pasientopplysninger om smittekilden, slik som navn, pers.nr. eller diagnose, skal IKKE skrives inn i skjemaet.

Saken blir sendt til din leder. Du vil deretter få en e-post med lenke til saken der du kan følge med på den videre saksbehandlingen.

Har du kun tilgang til Forskernett (Rikshospitalet/Radiumhospitalet), registrerer du HMS-avvik på papirskjema (tilsvarende elektronisk skjema) som finnes i e-Håndboken, HMS.

Dokument-ID: 58
Versjon: 15
Status: Godkjent

Dokumentansvarlig:
 Trond Erik Bakkerud

Godkjent av
 Jill Charlotte Jahrmann

Godkjent fra:
 10.03.2025

1. Endringer siden forrige versjon

Endret oppsett av tabell i avsnitt 4.2.

Oppdatert mhp. tilgjengelighet av hepatitt B-vaksine til hurtigvaksinering.

Oppdatert mhp. tilgjengelighet av anti - hepatitt B immunglobulin.

For øvrig mindre endringer.

2. Hensikt og omfang

Sikre rask informasjon og oppfølging til ansatte som har stukket seg på urene sprøytespisser, andre skarpe gjenstander eller blitt utsatt for søl av blod eller blodholdige kroppsvæsker på sår, rifter eller slimhinner. Ved dette vil en kunne redusere risiko for smitte.

Prosedyren omfatter også eksternt ansatte som får stikkskade mens de er i arbeid ved OUS.

3. Ansvar

Den ansatte selv plikter å gi melding til smittekildens ansvarlige lege og til nærmeste leder om smitteuhellet. Dette er viktig for å vurdere smitterisiko fra pasient til ansatt.

Leder med personalansvar har ansvar for at prosedyren gjøres kjent og følges i sine miljøer. Arbeidsmiljøavdelingen er ansvarlig for oppdatering og revisjon av denne prosedyren.

4. Fremgangsmåte

4.1 Strakstiltak/førstehjelp etter stikkskade

Type hendelse:	1	2	3
Stikkskade med spontan blødning	La det blø til det stopper spontant	Skyll med rikelig vann i 10 min.	Desinfiser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Stikkskade uten spontan blødning	Ikke provoser fram blødning ved å klemme	Skyll med rikelig vann i 10 min.	Desinfiser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Blodsprut på øyne eller slimhinner		Skyll med rikelig vann i 10 min.	
Blodsøl i sår		Skyll med rikelig vann i 10 min	Desinfiser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml

4.2 Oppfølging ved blodsmitte/mulig blodsmitte

Hent *Stikkskadekonvolutten* og følg framgangsmåten nedenfor:

Stikkskadekonvolutter kan du få:

- i papirformat ved henvendelse til Arbeidsmiljøavdelingen (se kontaktinformasjon nederst)
- i elektronisk utgave som du finner som vedlegg til denne instruksen. (Det er tre utgaver av den elektroniske "konvolutten" – for Aker, Rikshospitalet/Radiumhospitalet og Ullevål. Grunnen er at blodprøver sendes til ulike laboratorier.)

Det anbefales at enheten har noen ferdige stikkskadekonvolutter liggende lett tilgjengelig.

Ukjent smittekilde:

- Det tas blodprøver av den ansatte. Fyll ut rekvisisjoner som ligger i stikkskadekonvolutten.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

Svar blir sendt til Arbeidsmiljøavdelingen som følger opp den ansatte.
Kjent smittekilde (pasient): - Tilstedeværende leder kontakter straks ansvarlig lege som skal vurdere/dokumentere smittestatus og rekvirere blodprøver av smittekilde. Rekvisisjon ligger i stikkskadekonvolutten. Husk samtykke! Det er nødvendig med samtykke fra smittekilde for å ta blodprøver og gi prøvesvar til Arbeidsmiljøavdelingen. Smittekildens ansvarlige lege noterer i smittekildens pasientjournal at slikt samtykke er gitt. - Det tas blodprøver av den ansatte. Rekvisisjoner ligger i stikkskadekonvolutten. Kopi av svar blir sendt til Arbeidsmiljøavdelingen - Ansvarlig lege skal gi beskjed til den ansatte om smittekildens blodstatus, men den ansatte kan gjerne aktivt etterspørre ansvarlig lege om blodprøvesvarene til smittekilden.
Smittekilde med kjent Hepatitt B eller HIV - Tilstedeværende leder kontakter straks ansvarlig lege som skal vurdere/dokumentere smittestatus og rekvirere blodprøver av smittekilden. Husk samtykke ! - Leder må også kontakte Infeksjonsmedisinsk avdeling for bistand (hurtigvaksinering, annet) til den ansatte: -ved HIV-smitte: Ta kontakt snarest mulig -ved Hepatitt-B-antigen positiv smittekilde, når den ansatte ikke er vaksinert: Senest innen 48 timer Rikshospitalet/Radiumhospitalet: Seksjon for infeksjonssykdommer tlf. 23070530. Evt. call vakthavende infeksjonsmedisiner. Aker/Ullevål: Infeksjonsmedisinsk avd. tlf. 22119113. Evt. call vakthavende infeksjonsmedisiner. Infeksjonsavdelingene både på Ullevål og Rikshospitalet (RH) har hepatitt B - vaksine til hurtigvaksinering. - Immunglobulin, hasteutlevering ved hepatitt B - eksponering hos uvaksinerte: Sengepost transplantasjon ved RH har anti-hepatitt B immunglobulin tilgjengelig, tlf. (230) 70500/70497. Det er også mulig å få hasteutlevert immunglobulin fra Folkehelseinstituttet evt. Vitus apotek Jernbanetorget ved hepatitt B - eksponering hos uvaksinerte: I kontortiden: Ring Folkehelseinstituttet på tlf 21 07 70 00. Si at det gjelder øyeblikkelig hjelp og posteksponeringsprofylakse. Be om å få snakke med lege eller farmasøyt ved Avdeling for vaksine. Utenom Folkehelseinstituttets åpningstider: Leger kan henvende seg til Vitus apotek Jernbanetorget, Oslo, tlf. 23 35 81 00. Apoteket har døgnåpent og kan ved behov etablere kontakt med vakthavende lege ved Smittevernvakta, Folkehelseinstituttet, for vurdering av indikasjonsstilling og dosering. Smittevernvakta 21 07 63 48 kan ved behov kontaktes utenom arbeidstid for rådføring før bestilling fra Vitus apotek Jernbanetorget. Det tas blodprøver av den ansatte. Fyll ut rekvisisjoner som ligger i stikkskadekonvolutten. Svar blir sendt til Arbeidsmiljøavdelingen.

Blodprøvetaking: Ta med/fyll ut rekvisisjoner fra stikkskadekonvolutten.
Den ansatte tar blodprøver innen 24 timer på:

Aker	Radiumhospitalet	Rikshospitalet	Ullevål
Avd. for medisinsk biokjemi, prøvetaking, Bygg 5, 1. etg. (inngang via Bygg 11)	Avd. for medisinsk biokjemi, prøvetaking, Bygg L, 1. etg.	Avd. for medisinsk biokjemi, prøvetaking, B2 1.etg. (glassgaten)	Poliklinisk blodprøvetaking, Bygg 3, 1. etg.

Blodprøven kan også tas i egen avdeling hvis dette er mulig og den ansatte ønsker det.

Videre oppfølging av den ansatte blir gjort av Arbeidsmiljøavdelingen.

For spørsmål, ta kontakt med Arbeidsmiljøavdelingen, Forskningsveien 2B, 3. etasje. Tlf. 230 75 880.

4.3 Melding av stikkskaden - Se praktisk veiledning i stikkskadekonvolutten.

- **Den ansatte melder skaden elektronisk som HMS-avvik**
NB! Pasientopplysninger om smitekilden, slik som navn, pers.nr., diagnose, skal IKKE skrives inn i et HMS-avvik!
- **Leder kategoriserer og saksbehandler HMS-avviket** Kategoriseres som sakstype Smittevern, Stikk/kutt med smitterisiko. MERK at stikkskader ikke skal meldes til NAV eller forsikringsselskap med mindre det er påvist smitte hos den ansatte.
- Leder lukker deretter avviket.
- **Den ansatte og ansvarlig leder sender i tillegg inn skjemaet *Melding om stikkskade* i lukket konvolutt til Arbeidsmiljøavdelingen OUS, Forskningsveien 2B (internpost).**
Opplysninger om smitekilden oppgis i dette skjemaet.

Som vedlegg til denne instruksjonen og i Stikkskadekonvolutten finner du "Rutiner ved stikkskade / mulig blodsmitte". Vedlegget gir en enkel grafisk fremstilling av det som er beskrevet i pkt. 4 i denne instruksjonen og kan også brukes som oppslag på avdelingen.

5. Definisjoner

- **Stikkskade:** En personskade hos ansatt som ved uhell stikker seg på urene sprøytespisser eller får kutt/stikk av andre skarpe gjenstander. Det regnes også som stikkskade dersom man blir utsatt for søl av blod eller blodholdig kroppsvæske på sår, rifter eller slimhinner, eller om man blir utsatt for klor eller bitt.
- **Stikkskadekonvolutt:** En A4- konvolutt merket "Stikkskadekonvolutt" som skal ligge på alle avdelinger eller en elektronisk fil (vedlegg til denne instruksjonen). Konvolutten inneholder alle nødvendige skjemaer og opplysninger til den ansatte om hvordan man skal følge opp stikk- og kuttskader.
- **Smittekilde:** Potensiell smittekilde (pasient) med blod eller annen kroppsvæske som kan inneholde smittestoff. De aktuelle smittestoffene er; hepatitt-B, hepatitt-C og HIV.
- **Ansvarlig lege:** Smittekildens ansvarlige lege på dagtid. Ellers vakthavende lege på smittekildens avdeling.

Andre eHåndboksdokumenter

-  [Oppfølging av stikkskader](#)
-  [Stikkskadekonvolutt - Aker](#)
-  [Stikkskadekonvolutt - Rikshospitalet og Radiumhospitalet](#)
-  [Stikkskadekonvolutt - Ullevål](#)
-  [Blodsmitte - rutiner](#)

RUTINER VED STIKKSKADER /MULIG BLODSMITTE

Alle arbeidstakere som har stukket seg på urene sprøytespisser, skarpe gjenstander eller blitt utsatt for søl av blod eller blodholdige kroppsvæsker på sår, rifter eller slimhinner skal følges opp. **Bruk "STIKKSKADEKONVOLUTTEN"** som finnes på avdelingen eller som elektronisk vedlegg til instruksen "Stikkskadeoppfølging"

Strakstiltak / Førstehjelp

Stikkskader:


- La det blø til det stopper spontant.
Ikke provoser fram blødning ved å klemme.
- Skyll med rikelig vann i 10 min.
- Desinfiser med klorhexidinsprit 5mg/ml

Blodsprut på øyne eller slimhinner:

- Skyll med rikelig vann i 10 min

Blodsøl i sår:

- Skyll med rikelig vann i 10 min.
- Desinfiser med klorhexidinsprit 5mg/ml



Videre oppfølging av den ansatte blir gjort av Arbeidsmiljøavdelingen, tlf. 230 75880

Smitteuhell skal alltid meldes:

1. Som HMS-avvik i det elektroniske avvikssystemet
NB! Skriv ikke pasientopplysninger om smittekilden i HMS-avviket.
2. Send "Melding om stikkskade" i lukket konv. til Arbeidsmiljøavdelingen

Melding om stikkskade

Fylles ut av eksponert arbeidstaker sammen med ansvarlig lege og
sendes **Arbeidsmiljøavdelingen, Forskningsvn. 2B (internpost) i lukket konvolutt.**
HMS-avviksskjema fylles ut elektronisk på OUS's intranett

HMS-avviksnummer (kfr. Avviksnummer øverst på HMS-avviksskjemaet)	
---	--

Opplysninger om kildeperson

- **Kjent kildeperson** ☐

Kildepersonens navn

Fødselsdato

Avdeling

	Ja	Nei
Kildepersonen har samtykket til blodprøve og til å gi prøvesvar til Arbeidsmiljøavdelingen ?	☐	☐
Tatt blodprøve ?	☐	☐
Kjent HBsAg + ?	☐	☐
Kjent anti-HCV + ?	☐	☐
Kjent HCV-PCR + ?	☐	☐
Kjent HIV Ag/As + ?	☐	☐
Andre kjente risikofaktorer for blodsmitte ?	☐	☐

- **Ukjent kildeperson** ☐

Opplysninger om eksponert arbeidstaker

Eksponert arbeidstakers navn

Fødselsdato

Klinikk / Avdeling / telefonnr. på jobbtlf.:

Sykehus/lokalisasjon ☐Aker ☐Rad. ☐Riks. ☐Ullevål ☐Annet.....

Hjemmeadressepostnr./sted:.....

Telefon mobil:.....

	Ja	Nei
Tatt blodprøve ?	☐	☐
Fått immunglobulin mot hepatitt B ?	☐	☐
Hepatitt B fullvaksinert ?	☐	☐
Hepatitt B delvis vaksinert ?	☐	☐
Hepatitt B uvaksinert ?	☐	☐
Henvist til Infeksjonsmedisinsk seksjon ?	☐	☐

Dato: Eksponert arbeidstaker
(underskrift)

Ansvarlig lege/leder
(underskrift + stempel/blokkbokstaver)

.....

Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet
Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi
Pb. 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Tlf. 23 07 10 99 / 23 07 11 01

Virologiske og infeksjonsimmunologiske analyser

Rekvirent
Legenavn: **BREPÅL** HPR-nr. **7052537**

Enhet/Legekontor: **Bedriftshelsetjenesten,**

Adresse: **Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet** Telefon: **230 75880**
Postboks 4950 Nydalen

Postnr. **0424** Poststed **OSLO**

Kortkode / Rek.v.kode: **ARBPR**

Pasient
Fødselsdato: Personnr. Kvinne Mann

Etternavn - fornavn

Adresse

Postnr. Poststed

Rom-seng

Poliklinisk **X**

Inneliggende

Kopi av svar sendes til
Legenavn HPR-nr.

Avdeling/Legekontor

Adresse

Postnr./sted

Prøvetakingstidspunkt

D D M M Å Å

T T M M

Prøvetakers signatur

Problemstilling/klinske opplysninger (må inneholde angivelse av 1. sykdomsdag, kjente, kroniske infeksjoner/sykdommer, antiviral behandling, immunsuppresjon, evt. annen behandling, som blod og -produkter, som kan påvirke resultatet)

Laboratoriet kan endre rekvirerte analyser på grunnlag av kliniske opplysninger.

Prøvemateriale:

☐ Serum

☒ Serum med gel

☐ EDTA plasma

☐ EDTA fullblod

☐ EDTA med gel

☐ Spinalvæske

☐ Urin

☐ BAL

☐ Fæces uten tilsetning

☐ Nasopharynxprøve

☐ Biopsi fra

☐ Autopsi fra

☐ Sårsekret fra

☐ Annet:

For laboratoriet:

Mottatt dato:

☐ Serum

☐ Serum med gel

☐ EDTA plasma

☐ EDTA fullblod

☐ EDTA med gel

☐ Spinalvæske

☐ Urin

☐ BAL

☐ Nasopharynxprøve

☐ Biopsi

☐ Autopsi

☐ Sårsekret

☐ Annet, spesifiser

0 - prøve etter stikkskade/uhell (ansatt)

Prøveglass: ☐ serum m/gel ☐ serum u/gel ☐ EDTA blod ☐ EDTA plasma ☐ EDTA m/gel ☐ spesialrør

Valgfritt prøveglass dersom flere fargede bokser er oppgitt for analysen. For andre prøvematerialer, se Lab.håndbok.

Antigen-/antistoffanalyser (enkelt analyser), sett kryss i ruter:

☐ ☐ ☐ Borrelia-antistoff

☐ ☐ ☐ Cytomegalovirus-antistoff

☐ ☐ ☐ Epstein Barr virus-antistoff

☐ ☐ ☐ Hepatitt A-virus-antistoff

☐ ☐ ☐ Hepatitt Bs-antigen (HBsAg)

☐ ☐ ☐ Hepatitt Bs-antistoff

☐ ☐ ☐ Hepatitt Bc-antistoff

☐ ☐ ☐ Hepatitt C-antistoff

☐ ☐ ☐ HIV

☐ ☐ ☐ Rota-/adenovirus-antigen

☐ ☐ ☐ Mononukleose hurtigtest

Nukleinsyre påvisning (PCR analyser):

☐ ☐ Adenovirus

☐ ☐ Cytomegalovirus

☐ ☐ Epstein Barr virus

☐ ☐ Enterovirus

☐ ☐ Herpes simplex virus-1/2

☐ ☐ Humant Parvovirus-B19

☐ ☐ Polyomavirus (JCV/BKV)

☐ ☐ Toxoplasma gondii

☐ ☐ Varicellavirus

Andre aktuelle agens:

Analysepakker (hold i analysepakkene)

Organdonnøtt

☐ ☐ ☐ Donor, avdødd (ONEK)

☐ ☐ ☐ Donor, levende, organ (DOLEV)

☐ ☐ ☐ Donor morsmelk (DOMOR)

☐ ☐ ☐ Recipient (RECIP)

Testing av "celler og vev" donorer:

☐ ☐ ☐ Donor, celler, benmarg, stamceller osv. (CECEL)

☐ ☐ ☐ Donor, bein, brusk, knokler (CEBEI)

☐ ☐ ☐ Recipient, bein, brusk, knokler (CERECIP)

☐ ☐ ☐ Donor, muskler, ledd, hud, hjerteklaffer (CEMUS)

☐ ☐ ☐ Donor, hornhinne (CEHOR)

☐ ☐ ☐ Donor, sperma, testisvev IVF mann (CEMAN)

☐ ☐ ☐ Donor, ovarialvev, embryo, IVF kvinne (CEKVI)

Andre analysepakker:

☐ ☐ ☐ Stikkskade, kildeperson (STIKK)

☒ ☐ ☐ Stikkskade, skadet, 0-prøve (STIK0)

☐ ☐ ☐ Stikkskade, skadet, 3 mndr. (STIK3)

☐ ☐ ☐ Stikkskade, skadet, 6 mndr. (STIK6)

☐ ☐ ☐ Dialyse (DIALY)

☐ ☐ ☐ Preoperativ prøve (HJERT)

Spesialanalyser, inkludert soppanalysen/antistoffanalyser og referanseundersøkelser:

☐ ☐ ☐ Aspergillus (galaktomannan)-antigen

☐ ☐ ☐ Presipiterende Aspergillus-antistoff

☐ ☐ ☐ Antistoff mot dimorf sopp: (Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis)

☐ ☐ ☐ Antistoff mot fugleantigen (due, høns, undulat)

☐ ☐ ☐ Kryptokokk-antigen

☐ ☐ ☐ Referanseundersøkelse Toxoplasma – barn < 1 år (inkl. IgA)

☐ ☐ ☐ Referanseundersøkelse Toxoplasma – voksen (inkl. IgG-aviditet)

☐ ☐ ☐ TB-IGRA (QuantiFeron) **OBS spesialrør**

☐ ☐ ☐ CMV-IGRA (QuantiFeron) **OBS spesialrør**

☐ ☐ ☐ Cytomegalovirus – resistensundersøkelse (etter avtale)

☐ ☐ ☐ Cytomegalovirus – IgG-aviditet

EKSEMPEL

Avdeling for mikrobiologi, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Rikshospitalet



Rekvirent

Navn: **BREPÅL** HPR-nr. **7052537**

Enhet/Legekantor: **Bedriftshelsetjenesten,**

Adresse: **Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet** Telefon: **230 75880**

Postnr.: **0424** Poststed: **OSLO**

Kortkode: **ARBPR**

Pasient

Fødseldato: Personnr.: Dagpasient **X**

Poliklinisk

Inneiggende

Etternavn - fornavn

Adresse

Avsnitt

Postnr.: Poststed: Rom-seng

Kopi av svar sendes til:

Legenavn: HPR-nr:

Enhet/Legekantor:

Adresse:

Postnr.: Poststed:

Prøvetakingsdato: Klokkeslett:

☐ Akkreditert Prøvetakers brukernavn

prøvetaking

Venøs

Kapillær

Arteriell

CVK

☐ Blod ☐ Blod-smitte ☐ Faste

☐ Urin ☐ Spinalvæske ☐ Feces

☐ Annet, Ev. spesifiser

Volum (mL)

Samletid (timer:min)

Kliniske opplysninger:

0 - prøve etter stikkskade/uhell (ansatt)

Kun til bruk på DNR

☐ Bloodkultur ☐ Pretransfusjonsprøve

Ved innleggelse ICD-10 kode: Program: evt.

☐ NY ☐ Reinnl.

Legemiddel/Dosering:

Siste dose: (dd mm aa) Klokkeslett (time:min)

Øyeblikkelig hjelp Rutine

F = Faste L = Se Lab.håndbok

☐ Natrium ☐ Kolesterol, total ☐ Kolesterol, HDL ☐ Kolesterol, LDL ☐ Triglyserider **F** ☐ Apo A 1 ☐ Apo B ☐ Lp(a) ☐ Troponin ☐ CK-MB masse ☐ Myoglobin ☐ ProBNP ☐ Urinsyre ☐ Jern ☐ Transferrin ☐ Ferritin ☐ Transferrinreseptor ☐ Haptoglobin ☐ α -Antitrypsin ☐ Immunglob.kvant.

☐ ASAT **X** ☐ ALAT ☐ LD ☐ CK ☐ Amylase ☐ Magnesium

☐ Hb ☐ EVF (Hct) ☐ Leukocytt ☐ Trombocytt ☐ Erytrocytt ☐ Diff.telling ☐ Retik

☐ MCH/MCV/MCHC ☐ Utstryk ☐ Celler i spinalvæske

Andre ønskede analyser

Øyeblikkelig hjelp Rutine

☐ Kap. blodgass **L** ☐ Venøs blodgass **L** ☐ Arteriell blodgass **L** ☐ PTH og Fritt kalsium ☐ Fritt kalsium ☐ Hb i Plasma ☐ Osmolalitet

☐ Laktat **L** ☐ Pyruvat ☐ Ammonium ☐ INR ☐ APTT ☐ Fibrinogen ☐ D-Dimer ☐ Glukose, **F** ☐ Glukose, ikke **F** ☐ HbA_{1c}

☐ NYTX Kort ☐ NYTX Lang ☐ APCOR ☐ NYRP ☐ LEVP ☐ Telp

Analysereprofiler

☐ Proteinelektroforese ☐ IGF-1 **L** ☐ β_2 -Mikroglobulin ☐ Insulin **F** ☐ Ceruloplasmin ☐ C-peptid **F** ☐ Prealbumin ☐ Veksthormon

☐ TSH-R antistoff (TRAS) ☐ Vitamin ☐ Fritt tyroksin (FT4) ☐ Fritt T3 (FT3) ☐ TSH ☐ Østradiol

☐ Calcitonin **L** ☐ ACTH **L** ☐ S-Gallesyrer **F** ☐ Sink **L** ☐ Aluminium **L**

☐ Ciklosporin C0 ☐ Ciklosporin C2 **L** ☐ Takrolimus ☐ Everolimus

☐ Sirolimus ☐ Mykofenolat **L** ☐ 6-TGN ☐ Metotreksat ☐ Digoksin ☐ Valproat ☐ Fenytoin ☐ Karbamazepin ☐ Gentamycin ☐ Tobramycin ☐ Vancomycin ☐ TPMT-genotype ☐ CYP2C9-genotype ☐ CYP2C19-genotype ☐ CYP2D6-genotype ☐ CYP3A5-genotype ☐ VKORC1-genotype

FOR LABORATORIET

Antall	Type	Andre, spesifisert:
	Serum u/gel	
	Serum m/gel	
	Citrat	Dato og sign.:
	Heparin	
	EDTA	

17

EKSEMPEL

Avdeling for medisinsk biokjemi RH/DNR

IR-2448 02.14. 1380 0000. 50.000. Wiltsen & Jøsen 786963. 03301114

Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet
Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi
Pb. 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Tlf. 23 07 10 99 / 23 07 11 01

Virologiske og infeksjonsimmunologiske analyser

Rekvirent

Legenavn HPR-nr.

Enhet/Legekantor

Adresse Telefon

Postnr.

Kortkode/Rekv.kode

Fylles ut av ansvarlig lege på aktuell avdeling. (Se veiledning i stikkadekonvolutten.)

Pasient

Fødselsdato Personnr. Kvinne ☐ Mann ☐

Etternavn - fornavn

Adresse

Postnr. Poststed

Rom-seng -

Poliklinisk ☐

Inneliggende ☐

Kopi av svar sendes til

Legenavn HPR-nr.

Avdeling/Legekantor Bedriftshelsetjenesten, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Adresse Postboks 4950 Nydalen

Postnr./sted 0424 OSLO

BREPÅL

7052537

Prøvetakingstidspunkt

☐ D ☐ D ☐ M ☐ M ☐ A ☐ A

☐ T ☐ T ☐ M ☐ M

Prøvetakers signatur

Problemstilling/kliniske opplysninger (må inneholde angivelse av 1. sykdomsdag, kjente, kroniske infeksjoner/sykdommer, antiviral behandling, immunsuppresjon, evt. annen behandling, som blod og -produkter, som kan påvirke resultatet)

Laboratoriet kan endre rekvirerte analyser på grunnlag av kliniske opplysninger.

Prøve fra potensiell smittekilde (pasient).

Prøvemateriale:

- ☐ Serum
- ☐ Serum med gel
- ☐ EDTA plasma
- ☐ EDTA fullblod
- ☐ EDTA med gel
- ☐ Spinalvæske
- ☐ Urin
- ☐ BAL
- ☐ Fæces uten tilsetning
- ☐ Nasopharynxprøve
- ☐ Biopsi fra
- ☐ Autopsi fra
- ☐ Sårsekret fra
- ☐ Annet:

For laboratoriet:

- Mottatt dato:
- ☐ Serum
 - ☒ Serum med gel
 - ☐ EDTA plasma
 - ☐ EDTA fullblod
 - ☐ EDTA med gel
 - ☐ Spinalvæske
 - ☐ Urin
 - ☐ BAL
 - ☐ Nasopharynxprøve
 - ☐ Biopsi
 - ☐ Autopsi
 - ☐ Sårsekret
 - ☐ Annet, spesifiser

Sign. lab:
LABKODE:

Prøveglass: ☐ serum m/gel ☐ serum u/gel ☐ EDTA blod ☐ EDTA plasma ☐ EDTA m/gel ☐ spesialrør

Valgfritt prøveglass dersom flere fargede bokser er oppgitt for analysen. For andre prøvematerialer, se Lab.håndbok.

Antigen-/antistoffanalyser (enkelt analyser), sett kryss i rød boks:

- | | |
|---|---|
| ☐ ☐ ☐ Borrelia-antistoff | ☐ ☐ ☐ HTLV-1-antistoff |
| ☐ ☐ ☐ Cytomegalovirus-antistoff | ☐ ☐ ☐ HIV-1-antistoff |
| ☐ ☐ ☐ Epstein Barr virus-antistoff | ☐ ☐ ☐ Hepatitt A-antistoff |
| ☐ ☐ ☐ Hepatitt A-virus-antistoff | ☐ ☐ ☐ Hepatitt B-antistoff |
| ☐ ☐ ☐ Hepatitt Bs-antigen (HBsAg) | ☐ ☐ ☐ Hepatitt Bs-antistoff (anti-HBs) |
| ☐ ☐ ☐ Hepatitt Bc-antistoff (anti-HBc) | ☐ ☐ ☐ Hepatitt C-antistoff |
| ☐ ☐ ☐ HIV-1/2 | ☐ ☐ ☐ Rota-/adenovirus-antigen |
| ☐ ☐ ☐ He | ☐ ☐ ☐ Mononukleose hurtigtest |

EKSEMPEL

Nukleinsyre påvisning (PCR analyser):

- ☐ ☐ Adenovirus
- ☐ ☐ Cytomegalovirus
- ☐ ☐ Epstein Barr virus
- ☐ ☐ Enterovirus
- ☐ ☐ Herpes simplex virus-1/2
- ☐ ☐ Humant Parvovirus-B19
- ☐ ☐ Polyomavirus (JCV/BKV)
- ☐ ☐ Toxoplasma gondii
- ☐ ☐ Varicellavirus

Andre aktuelle agens:

Analysepakker

- Organdonor**
- ☐ ☐ ☐ Donor, alveolar (DOLEV)
 - ☐ ☐ ☐ Donor, lever, galle (DOLEV)
 - ☐ ☐ ☐ Donor morsmelk (DOMOR)
 - ☐ ☐ ☐ Recipient (RECIP)

analysepakkene)

- Testing av "celler og vev" donorer:**
- ☐ ☐ ☐ Donor, celler, benmarg, stamceller osv. (CECEL)
 - ☐ ☐ ☐ Donor, bein, brusk, knokler (CEBEI)
 - ☐ ☐ ☐ Recipient, bein, brusk, knokler (CERECIP)
 - ☐ ☐ ☐ Donor, muskler, ledd, hud, hjerteklaffer (CEMUS)
 - ☐ ☐ ☐ Donor, hornhinne (CEHOR)
 - ☐ ☐ ☐ Donor, sperma, testisvev IVF mann (CEMAN)
 - ☐ ☐ ☐ Donor, ovarialvev, embryo, IVF kvinne (CEKVI)

Andre analysepakker:

- ☒ ☐ ☐ Stikkade, kildeperson (STIKK)
- ☐ ☐ ☐ Stikkade, skadet, 0-prøve (STIK0)
- ☐ ☐ ☐ Stikkade, skadet, 2 mndr. (STIK3)
- ☐ ☐ ☐ Stikkade, skadet, 6 mndr. (STIK6)
- ☐ ☐ ☐ Dialyse (DIALY)
- ☐ ☐ ☐ Preoperativ prøve (HJERT)

Spesialanalyser, inkludert soppantigen/antistoffanalyser og referanseundersøkelser:

- | | |
|--|---|
| ☐ ☐ ☐ Aspergillus (galaktomannan)-antigen | ☐ ☐ ☐ Referanseundersøkelse Toxoplasma – barn < 1 år (inkl. IgA) |
| ☐ ☐ ☐ Presipiterende Aspergillus-antistoff | ☐ ☐ ☐ Referanseundersøkelse Toxoplasma – voksen (inkl. IgG-aviditet) |
| ☐ ☐ ☐ Antistoff mot dimorf sopp: (Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis) | ☐ ☐ ☐ TB-IGRA (QuantiFeron) OBS spesialrør |
| ☐ ☐ ☐ Antistoff mot fugleantigen (due, høns, undulat) | ☐ ☐ ☐ CMV-IGRA (QuantiFeron) OBS spesialrør |
| ☐ ☐ ☐ Kryptokokk-antigen | ☐ ☐ ☐ Cytomegalovirus – resistensundersøkelse (etter avtale) |
| | ☐ ☐ ☐ Cytomegalovirus – IgG-aviditet |